

100 ml-250 ml cam şişe için:
Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
CAL-VET
Perfüzyonluk Çözelti
Veteriner Mineral

BİLEŞİMİ

Cal-vet Perfüzyonluk Çözelti, açık sarı renkli, berrak, kullanıma hazır, steril perfüzyonluk çözelti olup, 100 ml'de 20 g Kalsiyum glukonat, 4,5 g Kalsiyum glukohexonat, 0,5 g Kalsiyum D-sakkarat, 3,4 g Magnezyum klorür, 4,1 g Borik asit içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Cal-vet Perfüzyonluk Çözelti, paranteral yollardan verilmek üzere hazırlanmış bir kalsiyum, magnezyum kombinasyonudur. Özellikle ruminantlar olmak üzere bütün evcil hayvanlarda sıklıkla karşılaşılan kalsiyum ve magnezyum eksikliklerini ve dengesizliklerini sağlamak amacıyla kullanılır. Cal-vet Perfüzyonluk Çözeltinin içerdiği etken maddelerin yoğunluğu itibari ile uygulama yerlerinde ağrı, acı, apse ve nekroz sakıncası yaratmaz. Bu nedenle bütün paranteral yollardan güvenle verilebilir.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

Hipokalsemik felç olaylarında, başta sığırlar olmak üzere bütün evcil hayvanlarda kalsiyum eksikliklerine karşı koruyucu olarak, doğum humması, laktasyon tetanisi, çayır ve hipomagnezemik tetani, seyahat ve çayır tetanileri olarak tanınan hastalıklarda, raşitizm ve osteomalasi, genç hayvanlarda görülen büyümenin yavaşlaması veya durması, üreme performansının azalması; alerjiler, zehirlenmeler, sinirsel kökenli bozukluklar (morbus maculozus, serum hastalığı, eklemisi'ler, anafilaksiler, eksantemler, hemorajik diyatezler, hematuri olayları ve alerjik olayların yatıştırılmasında.); kloroform, karbontetraklorür, organik fosforlu insektisitler başta olmak üzere cıva, kurşun, bakır, kalay, kadmiyum gibi metallerle meydana gelen zehirlenmeler, besinsel zehirlenmeler ve hayvan sokmalarında, yüksek miktarda fosfor ve fosfat alımını gerektiren durumlarda kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde,

Doz Tablosu

Sığır	(250-500 kg canlı ağırlık)	250-500 ml
At	(250-500 kg canlı ağırlık)	100-250 ml
Koyun, Keçi	(25-50 kg canlı ağırlık)	50-150 ml
Köpek	(3-25 kg canlı ağırlık)	3-25 ml

Damar içi, adale içi ve deri altı yolla uygulanır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Uygulanacak infüzyon miktarı, hayvanın canlı ağırlığının yanında, klinik durumu ve laboratuvar çalışmalarına dayanılarak ayarlanmalıdır. Hızlı uygulamadan kaçınılmalıdır. Vücut ısısına getirerek kullanınız.

İSTENMEYEN ETKİLER

Damar içi kalsiyum uygulamasının ardından, kalpte düzensizlik, bradikardi, kalp blokajı, bulantı veya kusma ve enjeksiyon bölgesinde reaksiyon görülebilir. Ancak, kas içi ve deri altı uygulamalarda, bu gibi yan etkiler oldukça az görülür.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Oral tetrasiklinlerle kalsiyum bileşiklerinin bir arada kullanılması tetrasiklinlerin emilimini azaltır. Ayrıca, nöromusküler blokörler, karbonatlar veya bikarbonatlar, fosfatlar, sülfatlar ve tartaratlarla geçimsizdir. Kalsiyum ve D vitamini analogları ile aynı anda uygulanması, hiperkalsemiye neden olabilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Kalsiyum tuzları kalp zehridir. Damar içi uygulamalarda kalp atımları sürekli dinlenmelidir. Nabız sayısında artış görülürse uygulamaya son verilmelidir. Eğer kalsiyum zehirlenmesi söz konusu ise %10'luk magnezyum sülfat çözeltisi 300 ml (normal büyüklükte bir inek için), damar içi yolla uygulanarak zehirlenmenin önüne geçilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için '0' gündür.

KONTRENDİKASYONLARI

Hiperkalsemi, hiperkalsiüri ve kalp yetmezliği durumlarında kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

Vücut ısısına getirerek kullanınız.

Çözelti berrak değilse ve vakum bozulmuşsa kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İlaçla temastan kaçınınız ve kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü cam şişeler için: 36 ay, polipropilen şişeler için: 24 aydır.

Işıktan koruyunuz. Oda sıcaklığında (15-25°C 'de) saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

100-250 ml'lik renksiz cam şişelerde ve karton kutu içerisinde.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 29.09.2004**T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO: 10.08.1990-007/0607****PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ ADI VE ADRESİ**

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

100 ml-250 ml cam şişe için:

Dış Ambalaj Etiket

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

CAL-VET

Perfüzyonluk Çözelti

Veteriner Mineral

BİLEŞİMİ

100 ml'de 20 g Kalsiyum glukonat, 4,5 g Kalsiyum gluukoheptonat, 0,5 g Kalsiyum D-sakkarat, 3,4 g Magnezyum klorür, 4,1 g Borik asit içerir.

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR

Hipokalsemik felç olaylarında, başta sığırlar olmak üzere bütün evcil hayvanlarda kalsiyum eksikliklerine karşı koruyucu olarak, doğum humması, laktasyon tetanisi, çayır ve hipomagnezemik tetani, seyahat ve çayır tetanileri olarak tanınan hastalıklarda, raşitizm ve osteomalasi, genç hayvanlarda görülen büyümenin yavaşlaması veya durması, üreme performansının azalması; alerjiler, zehirlenmeler, sinirsel kökenli bozukluklar (morbus maculozus, serum hastalığı, eklemisi'ler, anafilaksiler, eksantemler, hemorajik diyatezler, hematuri olayları ve alerjik olayların yatıştırılmasında.); kloroform, karbontetraklorür, organik fosforlu insektisitler başta olmak üzere cıva, kurşun, bakır, kalay, kadmiyum gibi metallerle meydana gelen zehirlenmeler, besinsel zehirlenmeler ve hayvan sokmalarında, yüksek miktarda fosfor ve fosfat alımını gerektiren durumlarda kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde,

Doz Tablosu

Sığır	(250-500 kg canlı ağırlık)	250-500 ml
At	(250-500 kg canlı ağırlık)	100-250 ml
Koyun, Keçi	(25-50 kg canlı ağırlık)	50-150 ml
Köpek	(3-25 kg canlı ağırlık)	3-25 ml

Damar içi, adale içi ve deri altı yolla uygulanır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Bulunmamaktadır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve gıda maddelerinden uzakta saklayınız.

Vücut ısısına getirerek kullanınız.

Çözelti berrak değilse ve vakum bozulmuşsa kullanmayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü cam şişeler için: 36 ay, polipropilen şişeler için: 24 aydır.

Işıktan koruyunuz. Oda sıcaklığında (15-25°C 'de) saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

100-250 ml'lik renksiz cam şişelerde ve karton kutu içerisinde.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO: 10.08.1990-007/0607

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

SERİ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ:

KDV DAHİL P.S.F.:

100 ml-250 ml cam şişe için:

İç Ambalaj Etiket

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

CAL-VET

Perfüzyonluk Çözelti

Veteriner Mineral

BİLEŞİMİ

100 ml'de 20 g Kalsiyum glukonat, 4,5 g Kalsiyum glukohptonat, 0,5 g Kalsiyum D-sakkarat, 3,4 g Magnezyum klorür, 4,1 g Borik asit içerir.

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR

Hipokalsemik felç olaylarında, başta sığırlar olmak üzere bütün evcil hayvanlarda kalsiyum eksikliklerine karşı koruyucu olarak, doğum humması, laktasyon tetanisi, çayır ve hipomagnezemik tetani, seyahat ve çayır tetanileri olarak tanınan hastalıklarda, raşitizm ve osteomalasi, genç hayvanlarda görülen büyümenin yavaşlaması veya durması, üreme performansının azalması; alerjiler, zehirlenmeler, sinirsel kökenli bozukluklar (morbus maculozus, serum hastalığı, eklemisi'ler, anafleksiler, eksantemler, hemorajik diyatezler, hematuri olayları ve alerjik olayların yatıştırılmasında.); kloroform, karbontetraklorür, organik fosforlu insektisitler başta olmak üzere cıva, kurşun, bakır, kalay, kadmiyum gibi metallerle meydana gelen zehirlenmeler, besinsel zehirlenmeler ve hayvan sokmalarında, yüksek miktarda fosfor ve fosfat alımını gerektiren durumlarda kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde,

Doz Tablosu

Sığır	(250-500 kg canlı ağırlık)	250-500 ml
At	(250-500 kg canlı ağırlık)	100-250 ml
Koyun, Keçi	(25-50 kg canlı ağırlık)	50-150 ml
Köpek	(3-25 kg canlı ağırlık)	3-25 ml

Damar içi, adale içi ve deri altı yolla uygulanır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Bulunmamaktadır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve gıda maddelerinden uzakta saklayınız.

Vücut ısısına getirerek kullanınız.

Çözelti berrak değilse ve vakum bozulmuşsa kullanmayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü cam şişeler için: 36 ay, polipropilen şişeler için: 24 aydır.

Işıktan koruyunuz. Oda sıcaklığında (15-25°C 'de) saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

100-250 ml'lik renksiz cam şişelerde ve karton kutu içerisinde.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO: 10.08.1990-007/0607

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

SERİ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ: