

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

GUADREKS

Enjeksiyonluk Çözelti

Kedi ve Köpek için Antihelmintik

BİLEŞİMİ

Guadreks Enjeksiyonluk Çözelti, renksiz veya pembe sarımsı renkli, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk çözelti olup, 1 ml’de 56.8 mg Prazikuantel içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Guadreks Enjeksiyonluk Çözelti’nin, etken maddesi olan Prazikuantel, izokinolin bileşiklerinden olup geniş spektrumlu bir antihelmintiktir. Etki mekanizması kesin olarak bilinmemekle birlikte, parazitin plazma membranından kalsiyum iyonlarının geçişini artırarak etkili olur. Böylece hücreler arası kalsiyumda azalma ve kayıp meydana getirmekte ve bunun sonucunda helmintin kas sisteminde kasılma ve felçlere neden olarak, onun bağırsak içerisinde tutunmasını engelleyerek atılmasını temin etmektedir. Sonuçta helmintin bir kısmı parçalanmış segmentler şeklinde gaita ile dışarı atılırken, bir kısımda bağırsaklar tarafından sindirilir.

Prazikuantel, parenteral uygulama sonrasında hızla vücutta dağılarak, %80 oranında plazma proteinine bağlanır. Eleminasyon yarılanma ömrü 2-3 saattir. Hızlı bir şekilde böbrek ve karaciğerde metabolize olarak, 24 saat içerisinde dozun yaklaşık %80’i idrar, kalanı ise safra ve böbrek lümenleri vasıtası ile elimine edilir.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

Guadreks Enjeksiyonluk Çözelti, kedi ve köpekte aşağıda belirtilen tenyaların (şerit, yassı solucan) ergin ve larval formlarının mücadelesinde etkin bir şekilde kullanılır.

Echinococcus granulosus

Dipylidium caninum

Echinococcus multilocularis

Dipyllobothrium erinacei

Taenia hydatigena

Mesocystoides corti

Taenia ovis

J. pasqualei

Taenia psiformis

Taenia taeniformis

Multiceps multiceps

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde,

Farmakolojik doz: 5.68 mg/kg canlı ağırlık

Pratik doz: 1 ml/10 kg canlı ağırlık dozda deri altı veya kas içi yolla uygulanır.

Köpeklerde

2.5 kg	canlı ağırlığın arasındakilere ve yavrulara	0.25 ml
--------	---	---------

2.5-5 kg	canlı ağırlık arasındakilere	0.25-0.5 ml
----------	------------------------------	-------------

5-10 kg	canlı ağırlık arasındakilere	0.5-1.0 ml
---------	------------------------------	------------

10-20 kg	canlı ağırlık arasındakilere	1-2 ml
----------	------------------------------	--------

Maksimum doz 3 ml’dir.

Kedilerde

1 kg	canlı ağırlığın arasındakilere ve yavrulara	0.1 ml
1-2 kg	canlı ağırlık arasındakilere	0.1-0.2 ml
2-3 kg	canlı ağırlık arasındakilere	0.2-0.3 ml
3-5 kg	canlı ağırlık arasındakilere	0.4-0.5 ml
5 kg ve üzeri	canlı ağırlık arasındakilere	0.6 ml

Minimum ve maksimum Prazikuantel dozları 3.5-7.5 mg/kg'dır. Küçük hayvanların metabolik aktiviteleri daha yüksek olduğundan, nispeten daha yüksek dozlara ihtiyaç gösterirler. 25 kg'dan ağır köpeklerle kas içi tavsiye edilir. Deri altı tatbikte kısa süreli geçici bir ağrı görülebilir. 3 ml'den fazla uygulama zorunlu olursa, 2 ayrı bölgeye bölünmek şartıyla deri altına uygulanmalıdır. Kedilerde deri altı ve kas içi tatbik sonrası ağrı meydana getirmez. Kullanırken asepti ve antiseptiye uyulmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Ekinokoktan şüphe edildiğinde, kas içi tatbik edilmelidir. Sestodlarla enfeste olmuş hayvanlarda yeni bir enfestasyondan korunmak, asıl amaç olmalıdır. Şayet ilaç uygulaması sonrası, gaita muayenesi yaptırmak mümkün olmazsa; ikinci bir ilaçlama zorunludur. Keza saha ve çiftlik şartlarında köpeklerin pirelerle temas ve bulaşma ihtimaline karşı mutlaka ikinci bir ilaçlama gerekir. Tenya tedavisi ile birlikte hayvanların ve meskenlerinin akarisit ilaçlaması kesinlikle yapılmalıdır. Reenfestasyondan korunmak için; *Dipylidium caninum*'a karşı 2-3 hafta, *Echinococcus granulosus*'a karşı ise 9-10 hafta, aralıklarla dışkı kontrolleri yapıldıktan sonra Guadreks Enjeksiyonluk Çözelti enjeksiyonları tekrarlanmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Prazikuantelin güvenlik indeksi çok geniş olup, 20 misli yüksek dozlarda dahi (100 mg/kg canlı ağırlık), kedi ve köpeklerde herhangi bir toksikasyona neden olmaz.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Deksametazon uygulaması Prazikuantelin serum konsantrasyonunu azaltabilir.

KONTRENDİKASYONLAR

Sütten kesilmeyen kedi ve köpek yavrularında tenya enfestasyonu çok nadir olarak görülebileceğinden: kedi yavruları 6, köpek yavruları 4 haftalık yaşa gelmeden Prazikuantel uygulamasına gerek yoktur.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

DOZ AŞIMI VE ALINACAK ÖNLEMLER

İri yapılı köpeklerde hassasiyet görülebileceğinden, mütaakip enjeksiyonlar kas içine yapılmalıdır. Pratikte doz aşımı söz konusu olmasa da aşırı doz ve hassasiyete bağlı olarak nadiren görülebilecek klinik semptomlar:

Köpeklerde: İştahsızlık, geçici ishal, koordinasyon bozukluğu, uyuşukluk.

Kedilerde: Bunlara ilaveten salivasyon, kusma, halsizlik, depresyon, sallantılı yürüyüş ve kas titremeleri görülebilir.

Klinik tabloya göre sağaltıma geçilir. (Semptomatik tedavi)

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İlaçla temastan kaçınınız ve kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Işıktan koruyunuz. Oda sıcaklığında (15-25°C'de) saklayınız.

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

20 ml'lik kahverengi flakonlarda/karton kutuda takdim edilmiştir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenehanelerinde, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 25.11.2004

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO:
09.05.2002-011/1045

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

İç-Dış Ambalaj

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

GUADREKS

Enjeksiyonluk Çözelti

Kedi ve Köpek için Antihelmintik

BİLEŞİMİ

1 ml'de 56.8 mg Prazikuantel içerir.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

Guadrex Enjeksiyonluk Çözelti, kedi ve köpekte kullanılan geniş spektrumlu bir antihelmintiktir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Farmakolojik doz: 5.68 mg/kg canlı ağırlık

Pratik doz: 1 ml/10 kg canlı ağırlık dozda deri altı veya kas içi yolla uygulanır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Işıktan koruyunuz. Oda sıcaklığında (15-25°C'de) saklayınız.

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

20 ml'lik kahverengi flakonlarda/karton kutuda takdim edilmiştir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenahanelerinde, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır. (VHR)

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO:

09.05.2002-011/1045

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMANIN ADI

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.