

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

KAFEVİL

Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Analeptik

BİLEŞİMİ

Kafevil Enjeksiyonluk Çözelti, renksiz veya açık sarı renkli berrak çözelti olup, 1 mL'sinde 250 mg kafein içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Kafevil Enjeksiyonluk Çözelti, içermekte olduğu kafein ksantin türevi bir alkaloiddir. Kafein oldukça etkin bir MSS uyarıcısıdır. Başlangıçta merkezi sisteminin uyarılmasından ötürü kalp atışı yavaşlasa da kısa bir zaman sonra kalp kasını uyararak kalp atışını düzenli olarak hızlandırır. Böylece kalbin gücü artar, nabız süratlenir, kan basıncı yükselir ve koroner damarlar genişlediğinden dolayı kalp daha iyi beslenir. Çizgili kasları uyararak kasılma ve efor gücünü artırır (Doping). Kafevil, sAMP'yi parçalayan fosfodiesterazın etkinliğini engelleyip hücrelerde bu nükleotidin yarı ömrünü uzatarak etkisini gösterir. Kafevil uygulama yerinden %100'e yakın oranda emilir ve vücuda dağılır. %80-85'i 48 saat içinde idrarla atılır.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

Kafevil Enjeksiyonluk Çözelti, merkezi sinir sisteminin ve özellikle de solunum merkezinin uyarılması gereken bütün durumlarda uyarıcı olarak kullanılır. Ateşli hastalıklarda (pnömoni, şap v.s.) kalbin mutlak potansiyelini artırıcı olarak, solunum sistemi uyarmada, özellikle kalp hastalıklarında portal ve renal sebeplere bağlı ascites'de, diüretik olarak (dijital ile birlikte), çizgili kasların faaliyetini arttırmada, doğum felçlerinde, narkoz zehirlenmelerinde, arekolin ve benzeri ilaçların kullanılmasından önce kalbi takviye etmek için kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Kafevil Enjeksiyonluk Çözelti, deri altı yolla tek doz olarak uygulanır.

Farmakolojik doz: 5-15 mg/kg canlı ağırlıktır.

Pratik doz:

At ve sığır: 2-6 ml/100 kg canlı ağırlık

Koyun ve keçi: 1-3 ml/50 kg canlı ağırlık

Köpek ve kedi: 0,1-0,3 ml/5 kg canlı ağırlık olarak uygulanır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Yarış atlarında doping etkisinden dolayı, yarıştan 10 gün önce uygulamaya son verilmelidir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Perifer damarları genişlettiğinden dolayı kan basıncında düşmeye neden olabilir. Hayvanlarda oksijen tüketiminde artışa, vücut ısısında yükselmeye, terlemeye, tremor ve kas tonusunda artışa sebep olabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diğer ilaçlarla herhangi bir etkileşimi yoktur. Birlikte kullanılabilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

Sığır, koyun ve keçilerde et ve süt için kalıntı arınma süresi "0" gündür.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Kafevil sağaltım güvenliği geniş bir ilaçtır. Ancak yüksek dozlarda aralıklı ve sürekli çırpınmalara neden olabilir. Bu etkileri barbitüratlarla engellenebilir. Kedi ve köpeklere parantral olarak yüksek dozlarda verilmesi öldürücü etki meydana getirebilir.

Gebelikte kullanım: Gebe hayvanlarda kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların erişemeyeceği yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü, oda sıcaklığında muhafaza edildiği takdirde imal tarihinden itibaren 24 aydır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Karton kutu içerisinde 20 ml'lik amber renkli cam şişelerde takdim edilmiştir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenehanelerinde, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 08.09.2011**T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO: 08.09.2011 – 024/0083****PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ**

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

Kutu

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
KAFEVİL
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Analeptik

BİLEŞİMİ

1 ml'sinde 250 mg kafein içerir.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

Kafevil Enjeksiyonluk Çözelti, merkezi sinir sisteminin ve özellikle de solunum merkezinin uyarılması gereken bütün durumlarda uyarıcı olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; deri altı yolla tek doz olarak uygulanır.

Farmakolojik doz: 5-15 mg /kg canlı ağırlıktır.

Pratik doz: At ve sığır: 2-6 ml/100 kg canlı ağırlık

Koyun ve keçi: 1-3 ml/50 kg canlı ağırlık

Köpek ve kedi: 0,1-0,3 ml/5 kg canlı ağırlık olarak uygulanır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

Sığır, koyun ve keçilerde et ve süt için kalıntı arınma süresi “0” gündür.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların erişemeyeceği yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü, oda sıcaklığında muhafaza edildiği takdirde imal tarihinden itibaren 24 aydır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Karton kutu içerisinde 20 ml'lik amber renkli cam şişelerde takdim edilmiştir.

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Kümeevleri No:765A Akyurt/ANKARA/TÜRKİYE

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Kümeevleri No:765A Akyurt/ANKARA/TÜRKİYE

Etiket

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

KAFEVİL

Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Analeptik

BİLEŞİMİ

1 mL'sinde 250 mg kafein içerir.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

Merkezi sinir sisteminin ve özellikle de solunum merkezinin uyarılması gereken bütün durumlarda uyarıcı olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Deri altı yolla tek doz olarak uygulanır. Farmakolojik doz: 5-15 mg /kg canlı ağırlıktır.

Pratik doz: At ve sığır: 2-6 ml/100 kg canlı ağırlık

Koyun ve keçi: 1-3 ml/50 kg canlı ağırlık

Köpek ve kedi: 0,1-0,3 ml/5 kg canlı ağırlık olarak uygulanır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

Sığır, koyun ve keçilerde et ve süt için kalıntı arınma süresi "0" gündür.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların erişemeyeceği yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü, oda sıcaklığında muhafaza edildiği takdirde imal tarihinden itibaren 24 aydır.

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA

VİLSAN Veteriner İlaçları San. Ve Tic. A.Ş. – Ankara