

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
OKSAVET
Oral Tablet
Veteriner Antihelmintik

BİLEŞİMİ

Oksavet Oral Tablet, beyaz-krem renkli, ortası çentikli tablet olup, 1 tablet 'de 300 mg oksfendazol, 600 mg oksiklozanid içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Oksavet Oral Tablet, sığır ve koyunlarda karaciğer kelebekleri, gastrointestinal nematodlar, akciğer kıl kurtları ve şeritlerle mücadelede kullanılan, geniş spektrumlu antiparaziter kombinasyondur.

Oksfendazol: Benzimidazol türevi bir antihelmintiktir. Parazitlerde fumarat redüktaz enzimi etkinliğini engelleyerek ve enerji metabolizmasını bozarak etkili olur. Oral yolla uygulama sonrası sindirim kanalından sınırlı ölçüde emilir. İdrar ve dışkı yolu ile vücuttan atılır.

Oksiklozanid: Salisilanid türevi bir antihelmintiktir. Parazitlerde oksidatif fosforilasyon kenetini kırarak etkili olur. Oral yolla uygulama sonrası sindirim kanalından büyük ölçüde emilir. Karaciğer, böbrek ve bağırsaklarda yüksek yoğunluklara ulaşır. Glukronid bileşiği halinde safra yolu ile vücuttan atılır.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

Sığır ve koyunlarda; mide-bağırsak ve akciğer kıl kurtlarının olgun ve genç şekilleri ile karaciğer kelebekleri ve *Moniezia spp.* erginlerine karşı tedavi ve korunma amaçlı kullanılır.

Oksavet Oral Tablet, aşağıdaki parazitler ile mücadelede başarı ile kullanılır:

Sığırlarda:

Karaciğer kelebekleri: *Fasciola hepatica*, *F.gigantica* (ergin)

Gastro-intestinal nematodlar: *Ostertagia spp.*, *Haemonchus sp.*, *Trichostrongylus sp.*, *Cooperia sp.*, *Oesophagostomum sp.*, *Nematodirus sp.*, *Strongyloides sp.*, *Bunostomum sp.*, *Trichuris sp.*

Akciğer kıl kurtları: *Dictyocaulus viviparus*.

Şeritler: *Moniezia sp.*

Koyunlarda:

Karaciğer kelebekleri: *Fasciola hepatica*, *F.gigantica*.

Gastro-intestinal nematodlar: *Ostertagia spp.*, *Haemonchus sp.*, *Trichostrongylus sp.*, *Cooperia sp.*, *Oesophagostomum sp.*, *Nematodirus sp.*, *Strongyloides sp.*, *Chabertia sp.*, *Trichuris sp.*

Akciğer kıl kurtları: *Dictyocaulus filaria*.

Şeritler: *Moniezia sp.*

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde,

Farmakolojik doz: Oksiklozanid 15-20 mg/kg, Oksfendazol 5-7,5 mg/kg canlı ağırlık dozda oral yolla kullanılır.

Pratik doz: 1 tablet/40 kg canlı ağırlık

Kuzu 1/2 tablet

Koyun 1 tablet

Dana 3-4 tablet

Sığır 5 tablet

İSTENMEYEN ETKİLER

Preparat oral yolla kullanıldığında önemli bir yan etkisi yoktur. Hafif nefes darlığı, hipotansiyon, defekasyon, ürinyasyon gibi yan etkiler geçici olup bir iki saat içinde kaybolur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bromsolan ile birlikte kullanıldığında ineklerde abort ve koyunlarda ölüme neden olabileceğinden bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen sığır sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt veren koyunlara uygulanamaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Karaciğer yetmezliği olan hayvanlarda tavsiye edilmez.

Gebelikte Kullanım: Benzimidazol grubu antihelmintiklerin embriyotoksik ve teratojenik etkilerinden dolayı koç katımı sırasında ve gebeliğin ilk 1/3'ünde bulunan hayvanlarda kullanılması kontrendikedir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İlaçla temastan kaçınınız ve kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır. Işıktan koruyunuz.

Oda sıcaklığında (15-25°C'de) saklayınız.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Boş ambalajlar çöpe atılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

10 tablet içeren blister/karton kutuda takdim edilmiştir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenehanelerinde, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 30.11.2004

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: 16.01.1996-008/0743

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

Dış Ambalaj Etiketi

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

OKSAVET

Oral Tablet

Veteriner Antihelmintik

BİLEŞİMİ

1 tablette 300 mg oksfendazol, 600 mg oksiklozanid içerir.

KULLANIM YERİ/ ENDİKASYONLAR

Sığır ve koyunlarda; mide-barsak ve akciğer kıl kurtlarının olgun ve genç şekilleri ile karaciğer kelebekleri ve

Moniezia spp. erginlerine karşı tedavi ve korunma amaçlı kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Farmakolojik doz: Oksiklozanid 15-20 mg/kg, Oksfendazol 5-7,5 mg/kg canlı ağırlık dozda oral yolla kullanılır.

Pratik doz: 1 tablet/40 kg canlı ağırlık

Kuzu 1/2 tablet

Koyun 1 tablet

Dana 3-4 tablet

Sığır 5 tablet

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen sığır sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt veren koyunlara uygulanamaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır.

Işıktan koruyunuz. Oda sıcaklığında (15-25°C'de) saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

10tablet içeren blister/karton kutuda takdim edilmiştir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenahanelerinde, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır. (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: 16.01.1996-008/0743

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

SERİ NO:

ÜRT-SKT:

KDV DAHİL PSF:

İç Ambalaj Etiketi (Bilister)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
OKSAVET
Oral Tablet
Veteriner Antihelmintik

BİİEŞİMİ

1 tablette 300 mg oksfendazol, 600 mg oksiklozanid içerir.

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ AMBLEMİ: VİLSAN

SERİ NO:

ÜRETİM VE SON KULLANMA TARİHİ: