

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

TİMPASOL

Oral Çözelti

Veteriner Gaz Giderici

BİLEŞİMİ

Timpasol Oral Çözelti, renksiz, berrak, kokusuz ve yağlı oral çözelti olup, 1 ml'de minimum %99 Asetiltribütilsitrat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Timpasol Oral Çözelti, Timpani ve köpüklü Rumen şişkinliklerinin sağaltımı amacıyla hazırlanmış olan bu formülasyon köpük giderici maddelerden Acetbutylate içerir. İlaç hayvanlara direk yolla iştirilerek veya rumene enjekte edilerek kullanılır.

Timpani, geviş getiren hayvanlarda görülen, karbonhidrat ve proteince zengin yemlerin çok yüksek miktarda yenmesine bağlı olarak oluşan rumen ve retikulumda aşırı miktarda gaz toplanması ile karakterize bir hastalıktır. Asetbutylate polimerize silikon türevi sentetik bir maddedir ve timpani oluşumuna neden olan taze bitkilerdeki pektin metil esteraz enziminin inhibitörüdür. Düşük konsantrasyonlar da bile, rumen içerisinde hızla yayılarak yüzey basıncını değiştirir, köpük şekillenmesini önler, şekillenmiş köpüğü giderir.

Geviş getiren hayvanların köpüklü rumen şişkinliklerinde yüzey gerilimini arttırıcı etkinliği sayesinde oluşan köpüklerin hızla patlamasına ve hapsolan gazların serbest kalmasına yol açmak suretiyle, abdominal basıncın azalmasını sağlar. Farmakolojik etkinliği sıvılarda yüzey gerilimini azaltması esasına dayandığında, köpüklenmenin boyutuyla orantılı dozlarda verildiğinde, dakikalar ile ölçülebilen kısa bir süreçte köpük giderici etkisi gelişir.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

Timpasol Oral Çözelti, sığır, koyun ve keçilerde görülen gazlı ve gazsız timpanilerin sağaltımında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde,

Timpasol Oral Çözelti, sığır, koyun ve keçilerde görülen timpanilerde oral ya da rumen içi yolla aşağıdaki dozlarda uygulanmalıdır.

Sığır : 20-30 ml

Koyun ve keçiler: 5-10 ml dozunda kullanılır.

Timpasol Oral Çözelti, kullanmadan önce bir miktar su ile karıştırılması uygulamayı kolaylaştıracaktır.

Veteriner hekim gerekli gördüğünde uygulama 6-10 saat sonra tekrarlanır. Uygulama sonucunda rumen ve retikulumda biriken gazın geçirme yolu ile atılması beklenir. Ancak geçirme mekanizmasında herhangi bir aksaklık söz konusu ise, birikmiş olan gazın bir sonda yardımı ile çıkarılması gerekli olacaktır.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Suda yaşayan türler için toksiktir. Su kaynaklarına karışmaması sağlanmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLERİ

Prospektüse göre uygulandığında herhangi bir yan etkisi yoktur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Okside eden ajanlar ile geçimsizdir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Önerilen dozlarda kullanıldığında herhangi bir yan etkisi yoktur. Asetbutylate toksisitesi düşük düzeydedir, fare ve ratlarda LD₅₀: 31.4 g/kg canlı ağırlık olarak belirlenmiştir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra et ve süt için "0" sıfır gündür.

KONTRENDİKASYONLARI

Zayıf bünyeli, yaşlı ve sistemik enfeksiyonlarla enfekte gebe hayvanlarda kullanımında dikkatli olunmalıdır. Sadece oral ve rumen içi kullanılır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İlaçla temastan kaçınınız ve kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Deri ile teması irritasyona neden olmaz.

Göz teması irritasyona neden olabilir. Göz ile teması halinde bol su ile yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Işıktan koruyunuz. Oda sıcaklığında (15-25°C'de) saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

100 ml ve 250 ml'lik amber renkli cam şişelerde kutulu olarak takdim edilmiştir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenehanelerinde, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır. (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 20.04.2009

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: 23.11.2006-017/0029

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

İç/Dış Ambalaj Etiketleri

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

TİMPASOL

Oral Çözelti

Veteriner Gaz Giderici

BİLEŞİMİ

1 ml'de minimum %99 Asetiltribütilsitrat içerir.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

Timpasol Oral Çözelti, sığır, koyun ve keçilerde görülen gazlı ve gazsız timpanilerin sağaltımında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde,

Timpasol Oral Çözelti, sığır, koyun ve keçilerde görülen timpanilerde oral ya da rumen içi yolla aşağıdaki dozlarda uygulanmalıdır.

Sığır : 20-30 ml

Koyun ve keçiler: 5-10 ml dozunda kullanılır.

GİDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra et ve süt için "0" sıfır gündür.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Işıktan koruyunuz. Oda sıcaklığında (15-25°C'de) saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

100 ml ve 250 ml'lik amber renkli cam şişelerde kutulu olarak takdim edilmiştir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenehanelerinde, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır. (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: 23.11.2006-017/0029

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

SERİ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ:

KDV DAHİL P.S.F.: