

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

VİLCAIN

Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Lokal Anestezik

BİLEŞİMİ

Vilcain Enjeksiyonluk Çözelti, renksiz, berrak, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk çözelti olup, 1 ml'de 20 mg Lidokain HCl ile 0.01 mg Adrenalin içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Vilcain Enjeksiyonluk Çözelti, veteriner pratikte sık kullanılan lokal anesteziyektir. Lidokain HCl amid grubu güçlü bir lokal anesteziyektir olup anti-aritmik bir maddedir. Lidokain, kolaylıkla yüzeysel anesteziye olanak vermesi, dokulardan hızla emilmesi, irkilti yapmaması ve meydana getirdiği anestezinin diğer lokal anestezilere göre daha kuvvetli, hızlı ve uzun süreli olması nedeniyle seçkin bir lokal anesteziyektir olarak nitelendirilmektedir.

Enjekte edildikten 5 dakika sonra anestezi başlar ve 3 saat devam eder. Enjeksiyon bölgesinden kolaylıkla emilir ve %70 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Plasentayı kolay geçer. Diğer organlara göre fetal karaciğer, kalp ve beyinde yüksek konsantrasyonda bulunabilir. Adrenalin canlı vücudunda da sentezlenen, adrenajik etkilere sahip bir maddedir. Vücutta MAO ve COMT (Kateşol - O - metiltransferaz) enzimleri tarafından metabolize edilir. Adrenalin, damar büzücü etkisi ile lidokainin etki süresini uzatır.

Lidokainin yarılanma ömrü 1,6 saattir. Atılımı, %90 metabolitler ve %10 değişmemiş ilaç halinde böbrekler yoluyla gerçekleşir. Adrenalinin metabolitleri idrarla atılır.

KULLANIM YERLERİ/ENDİKASYONLAR

At, kedi ve köpeklerde, güç doğum, sezaryen, prolapsus uteri gibi jinekolojik müdahaleler ile kastrasyon, kuyruk amputasyonu gibi operasyonlardan önce ve travma sonrası lokal anestezi sağlamak, bunun yanında infiltrasyon, sinir uzamı anestezisi, epidural ve bölgesel anestezi amacıyla kullanılır. Ayrıca ağız, burun ve boğaz bölgesi mukoz membranlarının yüzeysel anestezileri için de uygun bir anesteziyektir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde,

Kullanım amacına göre; deri altı, sinir uzamı ve epidural yolla uygulanır.

İnfiltrasyon anestezisi:

At	20-50 ml (azami doz: 150-200 ml)
Kedi, Köpek	2-5 ml (azami doz: kedide 5 ml, köpekte 30 ml)

Sinir uzamı anestezisi:

At	2-15 ml (azami doz: 30 ml)
----	----------------------------

Alt ve üst epidural anestezide:

At	5-20 ml
Kedi, Köpek	1-5 ml

Kullanım sırasında asepti ve antisepsiye dikkat edilmelidir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Vilcain'in dozları, kullanılacak lokal anestezi tekniğine, istenen anestezi derinliği ve süresine, uygulama sahasının vaskülarizasyonuna ve hayvanın bireysel tepkisine göre ayarlanmalıdır. Damar içi uygulamadan kaçınılmalı ve enjeksiyondan önce enjektör aspire edilerek kanülün damar içinde olmadığından emin olunmalıdır.

Vilcain, Asidoz, Diabetes mellitus, konjestif kalp yetmezliği, karaciğer bozukluğu, ağır solunum bozukluğu, hipovolemi, belirgin hipoksi ya da şok durumlarında dikkatle kullanılmalıdır. İçerdiği vazokonstriktör ajan nedeniyle, kan dolaşımı yetersiz olan vücut bölgelerinde işemi meydana getirebileceği hatırla tutulmalıdır.

Tek tırnaklılarda sadece lokal ve bölgesel anestezi için kullanılır. Enjeksiyon steril şartlarda yapılmalı ve kontaminasyon oluşturulmamasına dikkat edilmelidir. Operasyon bölgesine lokal antibiyotik tatbiki önerilmektedir.

İSTENMEYEN ETKİLERİ

Nadiren hipotansiyona neden olabilir.
Duyarlı hayvanlarda hipersensitivite gelişebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Mono amin oksidaz (MAO) inhibitörleri veya trisiklik antidepresan ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda Vilcain Enjeksiyonluk Çözelti uygulaması sonucu uzun süren hipertansiyon görülebilir.

Lidokainin eliminasyon ve metabolizmasını yavaşlattığı için, prokainamid, metoprolol veya propranolol gibi β -adrenerjik bloke edici ajanlar ile lidokainin müşterek kullanımında dikkatli olunmalı bu ilaçlar kalp rahatsızlığı bulunan hayvanlarda birlikte kullanılmamalıdır.

Amfoterisin, metohexsitin sodyum, sülfadiazin, ampicilin sodyum, sefazolin sodyum ile geçimsizdir. Lokal anestezi ile aynı zamanda verilen epinefrin benzeri maddeler anestezinin süresini uzatırlar. Morfin benzeri ağrı kesiciler lidokainin metabolizmasını hızlandırırlar. Köpeklerde lidokain ile birlikte pentobarbital kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Aşırı dozlarda kullanım ya da kazayla ilacın damar içi verilmesi durumunda ataksi, nistagmus, depresyon, konvülsiyon nöbetleri, bradikardi ve çok yüksek dozlarda dolaşım kollapsı şeklinde doz aşımı belirtileri ortaya çıkabilir. Bu semptomlar, diazepam ya da çok kısa etkili barbitüratların (Tiopental ya da tiamilal) uygulanması ile tedavi edilebilir. Ağır durumlarda oksijen desteği sağlanmalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Lokal anestetik maddeler, flegmonlu ve nekrozlu dokulara ya da parçalı yaralara infiltrasyon anestezisi uygulanması amacıyla kullanılmamalıdır.

Spinal kanalın enfeksiyonlarında, yaralanmalarında ve deformasyonlarında, epidural anestezi yapılmamalıdır.

Damar içi uygulama uygun değildir.

24 saat içinde 2 maksimum doz kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanım: İleri gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

Sadece veteriner hekim tarafından kullanılmalıdır.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Deriye ve göze temas ettirmeyiniz. Teması halinde derinizi, ellerinizi ve gözlerinizi bol su ile yıkayınız. İlacı uyguladıktan sonra ellerinizi mutlaka yıkayınız. Olası kendine enjeksiyonlara karşı tedbir alınmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Boş ambalajlar çöpe atılmalıdır. Farklı amaçlarla kullanılmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır.

Işıktan koruyunuz.

Oda sıcaklığında (15-25°C 'de) saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

20, 50 ve 100 ml'lik cam flakonlarda/ kutulu olarak takdim edilmiştir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenehanelerinde, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır.

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ:13.12.2004

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
21.02.2000-009/0882

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

İç ve Dış Ambalaj Etiketi (20,50,100 ml için)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

VİLCAIN

Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Lokal Anestezik

BİLEŞİMİ

1 ml'de 20 mg Lidokain HCl ile 0.01 mg Adrenalin içerir.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

Operasyonlardan önce ve travma sonrası lokal anestezi sağlamak amacıyla, infiltrasyon, sinir uzamı anestezi, epidural ve bölgesel anestezi için kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Doz tablosu için prospektüse bakınız.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI: İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Sadece veteriner hekim tarafından kullanılmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır. Işıktan koruyunuz. Oda sıcaklığında (15-25°C 'de) saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

20, 50 ve 100 ml 'lik cam flakonlarda/ kutulu olarak takdim edilmiştir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczaneler, veteriner muayenehaneleri ve polikliniklerinde satılır (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:

21.02.2000-009/0882

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

SERİ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ:

KDV DAHİL P.S.F.: (Sadece dış etiket)