

VADEMECUM

Hayvan saęlıęının geleceęini řekillendiriyoruz



HAKKIMIZDA



Hasvet Pharma, Türkiye, MENA bölgesi, Balkan ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri'nde, hayvan sağlığı ilaç üretiminde uzmanlaşmış en büyük ilaç grubudur. 40 yılı aşkın deneyimiyle, Elanco gibi global hayvan sağlığı markaları için ilaçlar üreten Hasvet Pharma, aynı zamanda birçok yerel şirket için de üretim yapmaktadır. Pi Farma, Verano, FDN İlaç ve Vilsan gibi tanınmış markalarla faaliyet gösteren ilaç grubumuz, Virbac ve Syva'nın global distribütörleri arasındadır.

Hasvet Pharma, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltma konusundaki kararlılığı ile sürdürülebilir bir hayvancılık politikasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Hasvet Pharma'nın önde gelen üretim tesislerinden biri olan Vilsan, GMP sertifikalı üretim hatlarıyla yılda yaklaşık 90 milyon kutuluk üretim kapasitesine sahiptir. Tesiste, Steril (NBL + BL) çözümleri, emülsiyonlar, IMM, Steril olmayan oral çözümler, oral tozlar (NBL + BL), tabletler ve Ektoparaziter ürünler gibi geniş bir ürün yelpazesi üretilmektedir ve bu ürünler ruminant, kanatlı ve su ürünleri sektörlerinde kullanılmaktadır.

Vilsan 25 ülkede faaliyet göstermektedir ve dünya çapında 20'den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. 62 yerel ve 13 ihracat ürünü olmak üzere toplamda 75 üründen oluşan kapsamlı bir ilaç portföy sunmaktadır ve hayvan sağlığı çözümlerinde lider bir rol oynamaya devam etmekte, dünya çapında hayvanların sağlığını iyileştirmeye katkıda bulunmaktadır.

İÇİNDEKİLER

<i>Sayfa</i>	ÜRÜN GRUPLARI
3	Antibakteriyeller
46	Meme Sağlığı Ürünleri
49	Antiparaziter Ürünler
69	Vitaminler, Mineraller ve Yem Katkıları
76	Klinik Ürünler
86	Perfüzyonluk Çözeltiler

Antibakteriyeller

Sayfa

ÜRÜNLER

4	Cefovil
5	Ceftivil
6	Cevilex
7	Doksivil
9	Favetrim Enjeksiyon
10	Favetrim Oral
12	Favetrim Aqua
14	Florvil Enjeksiyon
15	Florvil Aqua
17	Furavet
18	Erovil
19	Gentavilin
20	Gentavilin %10
21	Klavil
22	Lypectin
24	Makrovil Enjeksiyon
25	Makrovil

Sayfa

ÜRÜNLER

26	Neomivet
27	Penoksal
28	Penoksal LA
29	Primaful
30	Primavilin Enjeksiyon
31	Primavilin LA
32	Primavilin Aqua
34	Spiravil
35	Tavilin 200 Enjeksiyon
36	Tavilin
37	Vilamoks LA
38	Vilamoks 80
40	Vil-Floks Enjeksiyon
42	Vil-Floks Oral
44	Vil-Floks %20
46	Optivil

CEFOVİL

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Enjeksiyonluk Süspansiyon



BİLEŞİMİ: Cefovil Enjeksiyonluk Süspansiyon, beyazımsı veya krem renkli, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk süspansiyon olup, 1 ml'de 25 mg sefkuinom baza eşdeğer 29,64 mg ise sefkuinom sülfat içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Cefovil Enjeksiyonluk Süspansiyon, sığırlarda ve buzağılarda, sefkuinom'a duyarlı bakterilerin neden olduğu solunum yolu enfeksiyonları (özellikle penisiline dirençli bakterilerin), ayak enfeksiyonları (çatal çürüğü pododermatitis), ayrıca E.coli kaynaklı buzağı septisemileri, akut mastitis enfeksiyonları ve viral hastalıklarla beraber seyreden secunder enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde,

Farmakolojik doz: Sığırlara ve buzağılara 1 mg/kg canlı ağırlık olarak hesaplanır, kas içi yoldan uygulanır.

Pratik doz: 1 ml /25 kg canlı ağırlık gün dozunda Cefovil Enjeksiyonluk Süspansiyon uygulanır. Tedaviye 24 saat arayla 3-5 gün süre devam edilmelidir. Yenidoğan buzağılarda meydana gelen E. Coli kaynaklı septisemi enfeksiyonlarının tedavisi amacıyla 2 ml / 25 kg canlı ağırlık (normal dozun 2 katı) dozda kullanılması önerilmektedir. Mastitis tedavilerinde ise 24 saat aralıklarla 1ml/25 kg canlı ağırlık dozunda iki defa uygulanmalıdır. Kullanmadan önce şişeyi kuvvetlice çalkalayarak, süspansiyon homojen hale getirilmelidir.

CEFTİVİL

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Enjeksiyonluk Süspansiyon



BİLEŞİMİ: Ceftivil Enjeksiyonluk Süspansiyon, çalkalandığında beyaz renkli, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk süspansiyon olup, 1 ml'de 50 mg seftiofura eş değer seftiofur hidroklorür içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Sığırlarda seftiofura duyarlı; Mannheimia haemolytica (eski ismi Pasteurella haemolytica), Pasteurella multocida ve Histophilus somni (eski ismi Haemophilus somnus) suşları tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisi, Fusobacterium necrophorum ve Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica) tarafından meydana getirilen akut interdigital necrobacillosis (panarisyum, foot root) tedavisi, Doğumdan sonraki 10 gün içinde Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes ve Fusobacterium necrophorum tarafından meydana getirilen ve diğer antibiyotiklerle tedavinin başarısızlıkla sonuçlandığı akut post-partum (puerperal) metritis tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Kullanımdan önce şişeyi, 60 saniyeyi geçmeyecek veya yeterince süspanse olana kadar kuvvetlice çalkalayınız.

Doğru bir dozajlama için mümkün olduğunca hayvanların vücut ağırlıkları tam ölçülmelidir.

Solunum sistemi enfeksiyonları: Günde 1 mg/kg vücut ağırlığı dozunda 3-5 gün deri altı (her 50 kg vücut ağırlığı için günde 1 ml ürün)

Akut interdigital necrobacillosis: Günde 1 mg/kg vücut ağırlığı dozunda 3 gün deri altı (her 50 kg vücut ağırlığı için günde 1 ml ürün)

Aakut post-partum metritis (doğumdan sonraki 10 gün içinde): Günde 1 mg/kg vücut ağırlığı dozunda 5 gün deri altı (her 50 kg vücut ağırlığı için günde 1 ml ürün). Bu enfeksiyonda bazı durumlarda destekleyici tedavi gerekebilir.

CEVİLEX

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Enjeksiyonluk Süspansiyon



BİLEŞİMİ: CEVİLEX Enjeksiyonluk Süspansiyon, çalkalandığında beyazımsı veya krem renkli, kullanıma hazır, steril, enjeksiyonluk süspansiyon olup, 1 ml'de 150 mg Sefaleksine eşdeğer sefaleksinin monohidrat içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Sığırlarda sefaleksine duyarlı bakterilerin yol açtığı solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Septisemi, çatal çürüğü, kemik, eklem hastalıklarının enfeksiyonlarının tedavisinde ve septisemik mastitis tedavilerinde meme içi uygulamaları desteklemek amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde,

Farmakolojik doz: Sığırlarda 7,5 -10 mg/kg canlı ağırlık olarak hesaplanır.

Pratik doz: Sığırlarda 1ml/15-20 kg canlı ağırlık dozunda, kas içi yolla 5 gün süreyle uygulanır. Uygulamalar enfeksiyonun şiddetine ve seyrine, veteriner hekimin tavsiyesine göre 12 ve 24 saat aralıklarla tekrarlanabilir. Kullanmadan önce çalkalayınız.

DOKSİVİL

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Oral Çözelti Tozu



BİLEŞİMİ: Doksivil Oral Çözelti Tozu, sarı renkte bir çözelti tozu olup her gramında 500 mg Doksisisiklin'e eşdeğer 577 mg Doksisisiklin hiklat içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Aşağıda verilen duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sindirim ve solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Rumen faaliyetleri başlamamış buzağı:

- Pasteurella spp., Streptococcus spp., Arcanobacterium pyogenes, Histophilus somni ve Mycoplasma spp. tarafından meydana getirilen bronchopneumonia ve pleuropneumonia

Tavuk:

- Mycoplasma spp., Escherichia coli, Haemophilus paragallinarum, Bordetella avium tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonları

- Clostridium perfringens ve Clostridium colinum tarafından meydana getirilen sindirim sistemi enfeksiyonları

- Ayrıca Ornithobacterium rhinotracheale tarafından solunum sisteminde meydana getirilen lezyonların ve morbiditenin azaltılması

Hindi:

Mycoplasma gallisepticum tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonu

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Süt ikame gıdası ve/veya içme suyuna karıştırılarak uygulanır.

Buzağı: 10mg doksisisiklin hiklat/kg vücut ağırlığı/gün dozunda (20 mg ürün/kg vücut ağırlığı/gün) 3-5 gün boyunca, günlük doz ikiye bölünerek uygulanır.

Tavuk: 25 mg doksisisiklin hiklat/kg vücut ağırlığı/gün dozunda (45 mg ürün/kg vücut ağırlığı/gün) 3-5 gün boyunca uygulanır.

Hindi: 29 mg doksisisiklin hiklat/kg vücut ağırlığı/gün dozunda (50 mg ürün/kg vücut ağırlığı/gün) 3-5 gün boyunca uygulanır.

DOKSİVİL

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Oral Çözelti Tozu



Doğru bir dozajlama için hayvanların vücut ağırlığı mümkün olduğunca doğru hesaplanmalıdır. İlaçlı suyun hayvanlar tarafından alımı klinik duruma göre değişebilmektedir. Bu nedenle doğru dozun sağlanabilmesi için ilaçlı suyun konsantrasyonunun ayarlanması gerekebilir. Uygun kalibre ağırlık ölçüm ekipmanlarının kullanımı tavsiye edilir. İlaçlı suya katılacak günlük miktar 24 saat içerisinde tüketilecek şekilde ayarlanmalıdır. İlaçlı su her 24 saatte bir taze olarak hazırlanmalıdır. Ürünün önce bir miktar su ile iyice karıştırılması (konsantre ön karışım oluşturma), ardından gerekli ise bu karışımın gerekli oranda su ile sulandırılması tavsiye edilir. İlaçlı süt ikame gıdası derhal kullanılmalıdır. Tedavi edilmesi düşünülen tilin hayvanların ilaçlı su kaynaklarına rahatça erişebildiğinden emin olunmalıdır. Ürünün sub-terapotik dozda alımının önüne geçmek için tedaviden sonra sulama ekipmanları yeterince temizlenmelidir. Tedavi süresince ilaçlı su hayvanların tek su kaynağı olmalıdır. İlaçlı su metal kap içinde hazırlanmamalı veya depolanmamalı, paslanmış ekipman kullanılmamalıdır. Çözünürlük pH'ya bağlı olup, yüksek alkali özellikli içme sularında çökme meydana gelebilir.

FAVETRİM

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Enjeksiyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: Favetrim Enjeksiyonluk Çözelti, açık sarı renkli, berrak çözelti olup, 1 ml'sinde 200 mg sulfametoksazol ve 40 mg Trimetoprim içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Sığır, at, kedi, köpeklerde kombinasyona duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum, sindirim, ürogenital sistem ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Atlarda yavaş ve vücut ısısına yakın ven içi, diğer hedef türlerde kas içi ve yavaş ven içi yolla uygulanmalıdır. Tavsiye edilen farmakolojik doz sığır ve at için günlük 16-24 mg toplam aktif madde/kg vücut ağırlığı olup, pratik doz günlük 1 ml/10-15 kg vücut ağırlığı olarak uygulanır. Kedi ve köpeklerde farmakolojik doz 30 mg toplam aktif madde/kg vücut ağırlığı olup pratik olarak günlük 0.5 ml/4 kg vücut ağırlığı dozunda uygulanır.

Doğru dozaj için hayvanların vücut ağırlığı mümkün olduğunca doğru ölçülmelidir.

Damar içi uygulamalar yavaş yapılmalıdır.

Tedavi süresi 3-5 gündür. İlk uygulamadan sonraki 3 gün içerisinde önemli bir iyileşme görülmez ise teşhis gözden geçirilmelidir.

FAVETRİM

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Oral Süspansiyon



BİLEŞİMİ: Favetrim Oral Süspansiyon, beyaz, veya beyazımsı renkli süspansiyon olup, 1 ml'sinde 400 mg Sülfametoksazol ve 80 mg trimetoprim içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Favetrim Oral Süspansiyon, **buzağı, kuzu ve oğlaklarda;** duyarlı bakteriler tarafından oluşturulan sindirim ve ürogenital sistem enfeksiyonları ile özellikle Mannheimia haemolytica ve Pasteurella multocida'dan ileri gelen pneumoniler, pleuropneumonia, enzootik pneumoni gibi solunum sistemi enfeksiyonları, yumuşak doku enfeksiyonları, tırnak arası enfeksiyonları ve diğer yara enfeksiyonlarında kullanılır.

Etlik piliç ve hindilerde; bakteriyel kökenli diyareler, koliseptisemi, hava kesesi enfeksiyonları, salpingitis, kolera, koriza ve Stafilokok enfeksiyonlarında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Favetrim Oral Süspansiyon, rumeni gelişmemiş buzağı, kuzu ve oğlaklar ile etlik piliç ve hindilerde ağız yolu ile içirilerek veya içme suyuna katılarak uygulanır.

Buzağı, kuzu ve oğlaklarda;

Farmakolojik doz: 5 mg/kg trimetoprim + 25 mg/kg sülfametaksazol

Pratik doz: 2 ml / 10 kg canlı ağırlık dozunda içme suyuna katılarak oral yolla uygulanır. Toplam günlük doz ikiye bölünerek sabah ve akşam içirilmelidir.

Etlik piliç ve hindilerde;

Farmakolojik doz: 2.4 mg/kg trimetoprim + 12 mg/kg sülfametaksazol

Pratik doz: 100 kg canlı ağırlık için 3-6 ml Favetrim Oral Süspansiyon dozunda içme suyuna katılarak oral yolla uygulanır. Gerekli olan miktar günlük içme suyuna katılarak kullanılır.

İlaçlı suyun verilmesinden 2-3 saat kadar önce hayvanların susuz bırakılması tavsiye edilir.

Tedaviye 5-7 gün devam edilir.

FAVETRİM

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Oral Süspansiyon



ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Sülfametaksazol ve trimetoprim kombinasyonu geniş spektrumlu bir antibakteriyel olduğu için rumen faaliyeti başlamış kuzu ve buzağılarda kullanılması rumen faaliyetlerini bozucu etki gösterebilir. Bu nedenle bu hayvanlarda kullanılması önerilmez. Sülfonamidlerin dehidrasyon hallerinde ve asidik idrar ortamında nefrotoksik etkiler (kristalüri, tubuler obturasyon, hematuri v.b.) meydana getirebilecekleri dikkate alınarak tedavi sırasında hayvanların susuz kalmamalarına dikkat edilmelidir. Kanatlılarda su tüketiminin azalmasına neden olabilir.

Etkili konsantrasyon süresinin 12 saat civarında olması nedeniyle günlük doz ikiye bölünerek verilmelidir.

Özellikle yenidoğan kuzu, buzağı ve oğlaklarda sindirim sisteminin emme yeteneğinin çok iyi olması nedeniyle doz ayarlamasına dikkat edilmelidir.

FAVETRİM AQUA

Veteriner İlaçlı Premiks

Oral Toz



BİLEŞİMİ: FAVETRİM AQUA, beyaz renkte bir toz olup, her 1 kg'da 416,7g sülfadiazin ve 83,3g trimetoprim içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: FAVETRİM AQUA, başlıca tatlı ve tuzlu su balıklarında (çipura, levrek, alabalık) hastalıklara neden olan birçok gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı etkilidir. Kültür balıklarında bakteriyel hemorajik septisemi (*Aeromonas hydrophila*, *Pseudomonas* sp.), kolumnaris hastalığı (*Flexibacter columnaris*), kızıl ağız hastalığı (*Yersinia ruckerii*), streptokok enfeksiyonları (*P* hemolitik ve hemolitik olmayan *Streptococcus* sp.), soğuk su vibriozisi (*Vibrio salmonicida*), soğuk su hastalığı, winter disease (*Pseudomonas anguilliseptica*), ülser hastalığı (*Haemophilus piscium*) *Cytophaga psycrophila*'nın neden olduğu yavru gökkuşağı alabalık sendromu gibi hastalıkların sağaltımında başarıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde: FAVETRİM AQUA yem ile karıştırılarak oral olarak kullanılır.

Farmakolojik doz: 60 mg/kg/canlı ağırlık/gün sülfadiazin olacak şekilde balık yemlerine karıştırılmak suretiyle uygulanır.

Pratik doz: 0.1 g/kg canlı ağırlık olarak oral toz olarak balık yemlerine karıştırmak suretiyle uygulanır. **FAVETRİM AQUA ile tedaviye 7-10 gün boyunca devam edilir.**

Balık Yeminin Oranı (Canlı Ağırlığa Göre) (%)	1 Ton Yeme İlave edilecek Favetrim Aqua Oranı (kg)	1 ton yemde bulunması gereken trimetoprim miktarı (g)	1 ton yemde bulunması gereken sülfadiazin miktarı (g)
0.5	12	1000	5000
1	6	500	2500
2	3	250	1250

FAVETRİM AQUA

Veteriner İlaçlı Premiks

Oral Toz



İlaçlı Yemin Hazırlanması:

Daha önceden hesaplanarak tartılmış olan FAVETRİM AQUA ürünü, temiz, kuru ve hassas bir mikser veya yem karıştırıcısına konur. Karıştırma işlemi devam ederken % 1 oranında yağ, sprey şeklinde püskürtülür. Karıştırmaya 2- 5 dakika daha devam ettikten sonra homojen hale gelen yem ilaç karışımı kullanıma hazırlanmış olur. İlaçlı yem verilmeden önce balıklar 12 - 24 saat aç bırakılmalıdır. İlaçlı yem oranı suyun sıcaklığına ve balıkların büyüklüğüne göre değişebilir.

FLORVİL

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Enjeksiyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: Florvil Enjeksiyonluk Çözelti, hafif sarı renkli, berrak, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk çözelti olup, 1 ml'de 300 mg florfenikol içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: **Sığır:** Florfenikole duyarlı Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida and Histophilus somni suşları tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisi ve metafilaksisi. Metafilaktik kullanımdan önce sürüde hastalığı varlığından emin olunmalıdır.

Koyun: Mannheimia haemolytica ve Pasteurella multocida kökemli solunum sistemi enfeksiyonlarında kullanılır

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Tedavi:

Sığır: Kas içi veya deri altı yolla uygulanır.

Kas içi uygulama: 20 mg/kg canlı ağırlık (her 15 kg canlı ağırlık için 1 ml ürün) dozunda, iki defa, uygulamalar arasında 48 saat olarak.(16 ölçü iğne kullanınız)

Deri altı uygulama: 40 mg/kg canlı ağırlık (her 15 kg canlı ağırlık için 2 ml ürün) dozunda, tek doz olarak.

Metafilaksi: Deri altı uygulama: 40 mg/kg canlı ağırlık (her 15 kg canlı ağırlık için 2 ml ürün) dozunda, tek doz olarak.

Her iki uygulama yolu içinde bir enjeksiyon bölgesinde 10 ml'den daha fazla ürün uygulanmamalıdır. Enjeksiyon boyun bölgesinden yapılmalıdır.

Koyun: Kas içi yolla 20 mg/kg canlı ağırlık/gün (her 15 kg canlı ağırlık için günde 1 ml ürün) dozunda, 3 gün uygulanır. Bir bölgeye 4 ml'den fazla ürün uygulanmamalıdır. Farmakokinetik çalışmalar tavsiye dozunda uygulamada, ortalama plazma konsantrasyonunun 18 saate kadar MIC90 değerinin (1 µg / mL) üzerinde kaldığını göstermiştir. Tavsiye dozundan daha az miktarda ürün verilmesinin önüne geçmek için hayvanın vücut ağırlığı mümkün olduğunca doğru hesaplanmalıdır.

FLORVİL AQUA

Veteriner İlaçlı Premiks

Oral Toz



BİLEŞİMİ: FLORVİL AQUA Oral toz, beyaz krem renkli bir toz olup, 1 gr'da 500 mg florfenikol içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: FLORVİL AQUA Oral toz/Veteriner İlaçlı Premiks, tatlı (alabalık, somon, sazan) ve tuzlu su balıklarında (çipura, levrek) hastalıklara neden olan birçok gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı etkilidir. Kültür balıklarında görülen frunkulosis (*Aeromonas salmonicida*), kızıl hastalığı (*Vibrio anguillarum*), kızıl ağız hastalığı (*Yersinia ruckerii*), bakteriyel hemorajik septisemi (*Aeromonas hydrophila*, *Pseudomonas* sp.), kolumnaris hastalığı (*Flexibacter columnaris*), streptokok enfeksiyonları (I: hemolitik ve hemolitik olmayan *Streptococcus* sp.), soğuk su vibriozisi (*Vibrio salmonicida*), soğuk su hastalığı (*Cytophaga psychrophila*), winter disease (*Pseudomonas anguilliseptica*), Edwardsiellosis (*Edwardsiella ictaluri*, *Edwardsiella ictaluri*), pasteurellosis (*Photobacterium damse/a* subsp. *piscidia*) ve marine flexibacteriosis (*Tenacibaculum maritimum*) gibi bakteriyel enfeksiyonların sağaltımında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde: FLORVİL AQUA yem ile karıştırılarak oral olarak kullanılır.

Farmakolojik doz: 10 mg/kg canlı ağırlık etken madde olacak şekilde balık yemlerine karıştırılmak suretiyle uygulanır.

Pratik doz: 0.02 g/ kg canlı ağırlık olarak oral toz olarak balık yemlerine karıştırmak suretiyle uygulanır. Tedaviye 10 gün süre ile devam edilir.

FLORVİL AQUA

Veteriner İlaçlı Premiks



Oral Toz

Balık Yeminin Oranı (Canlı Ağırlığa Göre)	1 Ton Yeme İlave edilecek Florvil Aqua Oranı	10 günlük tedavi için kullanılacak ilaç miktarı
%0,5	4 kg	20 kg
%1	2 kg	10 kg
%2	1 kg	5 kg
%3	0,66 kg	3,33 kg
%5	0,4 kg	3 kg

FURAVET

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Oral Çözelti Tozu



BİLEŞİMİ: 1 gr'da 163,41 mg Oksitetrasiklin baza eşdeğer 176,35 mg Oksitetrasiklin hidroklorür ve 123,45 mg Neomisin baza eşdeğer 182,53 mg Neomisin sülfat içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Furavet Oral Çözelti Tozu, kanatlılarda, ruminasyonu başlanmamış kuzu ve buzağılarda neomisin ve oksitetrasikline duyarlı bakterilerin neden olduğu;
-Kanatlılarda solunum yolu enfeksiyonlarında (CRD), sindirim sistemi enfeksiyonlarından mavi ibik, Pullorum, tavuk kolerası, kanatlı tifosu, bakteriyel enteritis, enfeksiyöz sinovitisde kullanılır.
-Buzağı ve kuzularda solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Kanatlılarda ilacın uygulanması hayvanların belli bir süre susuz bırakıldıktan sonra, ilaçlı su kısa bir sürede tüketilecek şekilde yapılmalıdır. İlaçlı su günlük olarak hazırlanmalıdır. Kuzu ve buzağılarda bir miktar su ile karıştırılır ve bekletilmeden içirilir. Tedaviye 3 gün süreyle devam edilmelidir.

	Pratik Doz	Sağaltım Süresi
Civciv	80 mg toz / kg canlı ağırlık	3 gün
Tavuk, hindi	165 mg toz / kg canlı ağırlık	3 gün
Kuzu	1,3 g toz / 20 kg canlı ağırlık	3 gün
Buzağı	1 g toz / 20 kg canlı ağırlık	3 gün

EROVİL

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Oral Çözelti Tozu



BİLEŞİMİ: Erovil Oral Çözelti Tozu, 1 gr'ında 350 mg eritromisin baza eşdeğer 378,17 mg eritromisin tiyosiyanat içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Erovil Oral Çözelti Tozu, tavuk ve hindilerde kullanılır. Tavuk ve hindilerde Mycoplasma türleri tarafından meydana getirilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Hindi ve tavuklarda içme suyuna karıştırılarak 20-40 mg/kg eritromisin baz/gün dozunda 3-5 gün kullanılır. Pratik olarak her 1000 kg vücut ağırlığı için günde 58-115 gram ürün kullanılmalıdır. Doz aşımından kaçınmak için ürün miktarı doğru hesaplanmalıdır. İlaçlı su miktarı, hayvanların su alımlarını etkileyen yaş, sağlık durumu, çevre sıcaklığı gibi faktörlere göre değişebildiğinden, hayvanların ilacın tamamını alabileceği şekilde ayarlanmalıdır. Bu nedenle doğru dozun sağlanabilmesi için ilaçlı suyun konsantrasyonunun ayarlanması gerekebilir. Uygun kalibre ağırlık ölçüm ipmanlarının kullanımı tavsiye edilir. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır. İlacın su içerisinde tamamen karışması sağlanmalıdır. Hayvanların mümkün olduğunda eşit miktarda ilaçlı su tüketebilmesi için yeterince su kaynağı bulunmalıdır. Tedavi süresince hayvanların başka bir su kaynağından su içmelerine izin verilmemelidir. Az doz uygulamaktan kaçınmak için hayvanların vücut ağırlığı mümkün olduğu kadar doğru hesaplanmalıdır. Tedaviye başladıktan sonra 3 gün içerisinde önemli bir iyileşme görülmezse teşhis gözden geçirilmelidir. Tedaviden sonra sulama sistemi sub-terapotik doz alımını ve direnç gelişimini engellemek için iyice yıkanmalıdır.

GENTAVİLİN

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Enjeksiyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: Gentavilin Enjeksiyonluk Çözelti, renksiz, berrak, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk çözelti olup, 1 ml'de 50 mg. gentamisin baza eşdeğer gentamisin sülfat içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:

Sığır

Gastro-intestinal sistem enfeksiyonları, Üro-genital sistem enfeksiyonları, Septisemiler

Köpek, kedi

Solunum yollarının enfeksiyonları, Gastro-intestinal sistem enfeksiyonları, Üro-genital sistem enfeksiyonları, Kulak yolu enfeksiyonlarında (akut ve kronik bakteriyel dış kulak enfeksiyonları) Septisemiler

At

Gentamisin duyarlı gram negatif aerobik bakterilerin neden olduğu solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Doğru dozaj sağlamak için vücut ağırlığının olabildiğince doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekir.

Sığırlarda kas içi veya ven içi yolla uygulanır. Deri altı uygulanmaz. Günde iki kez, 2 mg gentamisin/kg canlı ağırlık (her 100 kg canlı ağırlık için 4 ml ürün) dozunda 3-7 gün boyunca yapılabilir. Doz hacmi büyük olduğunda, doz bölünerek uygulanmalıdır.

Atlarda ven içi yolla günde bir kez 6,6 mg/kg canlı ağırlık (her 100 kg canlı ağırlık için yaklaşık 13 ml ürün) dozunda 3-5 gün uygulanabilir. Yeni doğan taylarda kullanımı tavsiye edilmez.

Köpek ve kedilerde

Kas içi veya deri altı yolla ilk gün iki kez olmak üzere 4 mg/kg dozunda (her 5 kg canlı ağırlık için 0,4 ml ürün) günde bir kez 3-5 gün süreyle uygulanır.

GENTAVİLİN %10

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Enjeksiyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: Gentavilin %10 Enjeksiyonluk Çözelti, renksiz, berrak, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk çözelti olup, 1 ml'de 100 mg. gentamisin baza eşdeğer gentamisin sülfat içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: **Sığır:** Gastro-intestinal sistem enfeksiyonları, Üro-genital sistem enfeksiyonları, Septisemiler

Köpek, kedi: Solunum yollarının enfeksiyonları, Gastro-intestinal sistem enfeksiyonları, Üro-genital sistem enfeksiyonları, Kulak yolu enfeksiyonlarında (akut ve kronik bakteriyel dış kulak enfeksiyonları)Septisemiler

At: Gentamisin duyarlı gram negatif aerobik bakterilerin neden olduğu alt solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Doğru dozaj sağlamak için vücut ağırlığının olabildiğince doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekir.

Sığırlarda kas içi veya damar içi yolla uygulanır.

Günde iki kez, 2 mg gentamisin/kg canlı ağırlık (her 100 kg canlı ağırlık için 2 ml ürün) dozunda 3-7 gün boyunca yapılabilir. Doz hacmi büyük olduğunda, doz bölünerek uygulanmalıdır.

Atlarda damar içi yolla günde bir kez 6,6 mg/kg canlı ağırlık (her 100 kg canlı ağırlık için yaklaşık 6,5 ml ürün) dozunda 3-5 gün uygulanabilir.

Yeni doğan taylarda kullanımı tavsiye edilmez.

Köpek ve kedilerde

Kas içi veya deri altı yolla ilk gün iki kez olmak üzere 4 mg/kg dozunda (her 5 kg canlı ağırlık için 0,2 ml ürün) günde bir kez 3-5 gün süreyle uygulanır.

KLAVİL

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Enjeksiyonluk Süspansiyon



BİLEŞİMİ: KLAVİL Enjeksiyonluk Süspansiyon, beyazımsı veya krem renkli, steril süspansiyon olup, 1 ml'sinde 140 mg amoksisilin baza eşdeğer amoksisilin trihidrat ve 35 mg klavulanik asite eşdeğer potasyum klavulanat içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI: Bu ürün sığır, köpek ve kedilerde bulunan ve klinik olarak önemli bakterilere karşı bakterisidal etkilidir. In-vitro olarak betalaktamaz üreterek amoksisiline karşı direnç geliştirmiş bakteriler de dâhil geniş bir spektrum gösterir. Klinik olarak aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir:

Sığır

Solunum sistemi enfeksiyonları, yumuşak doku enfeksiyonları (göbek kordonu enfeksiyonları, abse vb), metritis.

Kedi ve köpeklerde

Solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (abse, piyodermilerin, anal bez enfeksiyonları ve gingivitis gibi)

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Sığırlarda kas içi (İM), köpek ve kedilerde deri altı (SC) veya kas içi (IM) uygulanır.

Önerilen doz oranı 3-5 gün boyunca günlük 8.75 mg/kg vücut ağırlığıdır (kg vücut ağırlığı için amoksisilin 7 mg ve klavulanik asit 1.75 mg) ya da 20 kg vücut ağırlığı başına 1 ml'dir.

Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın. Kuru ve steril şırınga ile iğne kullanın.

Her doz çekiminden önce tıpayı dezenfekte edin.

Sığırlarda enjeksiyon bölgesine uygulanacak en fazla hacim 10 ml'yi aşmamalıdır.

Renk değişikliği meydana gelmiş ürünler kullanılmamalıdır. Enjeksiyondan sonra, uygulama yerine masaj yapılmalıdır.

LYPECTİN

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Enjeksiyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: Her 1 ml'de 50 mg Linkomisin baza eşdeğer Linkomisin HCl ve 100 mg Spektinomisin baza eşdeğer Spektinomisin HCl bulunur.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Buzağı, koyun, keçi, kedi, köpek, tavuk, hindilerde aşağıda yer alan mikroorganizmaların duyarlı suşları tarafından meydana getirilen solunum, sindirim, üriner sistem enfeksiyonları ile yumuşak doku enfeksiyonları ve artritlerin tedavisinde kullanılır.

Actinobacillus spp.
Pasteurella spp.
Escherichia coli
Salmonella spp.
Campylobacter spp.
Bacteroides spp.
Clostridium spp.
Fusobacterium spp.
Actinomyces spp.
Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.
Mycoplasma spp.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Buzağı

Her kg vücut ağırlığı için 5 mg linkomisin ve 10 mg spektinomisin (her 10 kg vücut ağırlığı için 1 ml ürün) dozunda ilk gün iki doz, diğer günler tek doz olarak, kas içi yolla 3-5 gün boyunca uygulanır.

Koyun-keçi

Her kg vücut ağırlığı için 5 mg linkomisin ve 10 mg spektinomisin (her 10 kg vücut ağırlığı için 1

LYPECTİN

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Enjeksiyonluk Çözelti



ml ürün) dozunda günde tek doz olarak, kas içi yolla 3-5 gün boyunca uygulanır.

Tavuk ve Hindi

Her kg vücut ağırlığı için 10 mg linkomisin ve 20 mg spektinomisin (her 5 kg vücut ağırlığı için 1 ml ürün) dozunda günde tek doz olarak, deri altı yolla 3 gün boyunca uygulanır.

Kedi-Köpek

Her kg vücut ağırlığı için 10 mg linkomisin ve 20 mg spektinomisin (her 5 kg vücut ağırlığı için 1 ml ürün) dozunda kas içi yolla, günde 1-2 defa, klinik cevaba bağlı olarak 3-7 gün boyunca uygulanır.

Tüm hayvan türlerinde doğru dozajlama için hayvanların ağırlığı mümkün olduğunca doğru ölçülmelidir.

MAKROVİL

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Enjeksiyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: Makrovil Enjeksiyonluk Çözelti, sarıdan kahverengine kadar değişen renkte, berrak, steril enjeksiyonluk çözelti olup, 1 ml'de 300 mg tilmikosin baza eşdeğer tilmikosin fosfat içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: **Sığır:** Mannheimia haemolytica ve Pasteurella multocida kökenli sığır solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisi, İnterdigital necrobacillosis tedavisi

Koyun: Mannheimia haemolytica ve Pasteurella multocida kökenli solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisi, Dichelobacter nodosus ve Fusobacterium necrophorum kökenli Foot Rot tedavisi, Staphylococcus aureus ve Mycoplasma agalactia kökenli akut mastitis tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Sadece deri altı yolla uygulanır. Her kg vücut ağırlığı için 10 mg tilmikosin (her 30 kg vücut ağırlığı için 1 ml ürün) kullanılır.

Sığır: Uygulama metodu: Gerekli ürün miktarını şişeden enjektör ile çekiniz, iğneyi şişede bırakarak enjektörü iğneden ayırınız. Hayvanlar grup halinde tedavi edilecekse iğneyi, daha sonraki dozları enjektöre çekebilmek için şişede bırakınız. Uygulama yapılacak hayvanı tamamen zaptediniz ve başka bir iğneyi enjeksiyon bölgesine deri altı olarak yerleştiriniz (tercihen omuzun arkasında ve göğüs kafesinin üzerinde bir deri kıvrımına). Enjektörü iğneye yerleştiriniz ve ürünü enjekte ediniz. Bir bölgeye 20 ml'den fazla ürün uygulamayınız.

Koyun: Doz aşımından kaçınmak için kuzuların ağırlığının tam olarak ölçülmesi son derece önemlidir. 2 ml veya daha küçük hacimli enjektör kullanımı doğru dozajlamayı sağlamada kullanılabilir. Gerekli ürün miktarını şişeden enjektör ile çekiniz, iğneyi şişede bırakarak enjektörü iğneden ayırınız. Hayvanın iyice zaptırapta alarak, başka bir iğneyi deri altı olarak enjeksiyon bölgesine yerleştiriniz (tercihen omuzun arkasında ve göğüs kafesinin üzerinde bir deri kıvrımına). Enjektörü iğneye yerleştiriniz ve ürünü enjekte ediniz. Bir bölgeye 2 ml'den fazla ürün uygulamayınız. 48 saat içerisinde iyileşme görülmezse teşhis gözden geçirilmelidir. Kullanım sırasında şişenin kontamine olmaması için gerekli önlemleri alınız. Şişe gözle herhangi bir partikül veya anormal bir fiziksel görünüm açısından kontrol edilmeli, bunlara rastlanması halinde ürün kullanılmamalıdır.

MAKROVİL

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Oral Çözelti



BİLEŞİMİ: Makrovil Oral Çözelti; kahverengimsi sarı renkli çözelti olup, her ml'sinde 250 mg Tilmikosine eş değer Tilmikotin fosfat içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Etlik piliç ve etlik hindilerde: Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synovia'nın neden olduğu solunum yolu enfeksiyonları tespit edilen sürülerde hastalığın tedavisin ve önlenmesinde kullanılır. **Buzağılarda:** Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis ve Mycoplasma dispar'ın neden olduğu solunum yolu enfeksiyonları tespit edilen sürülerde hastalığın tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Sadece oral yolla kullanılır. Bu ürün kullanımdan önce su veya süt ikamesi ile sulandırılmalıdır. Etlik piliç ve etlik hindilerde içme suyu ile karıştırılarak, buzağılarda süt ikamesiyle karıştırılarak oral olarak kullanılır.

Etlik piliçlerde: 15 - 20 mg/kg/vücut ağırlığı/gün dozunda 3 gün süreyle kullanılır. Pratik olarak 100 kg vücut ağırlığına günde 6 - 8 ml ürün kullanılır.

Etlik hindilerde: 10 - 27 mg/kg/vücut ağırlığı/gün dozunda 3 gün süreyle kullanılır. Pratik olarak 100 kg vücut ağırlığına günde 4 - 11 ml ürün kullanılır.

Buzağılarda: 12.5 mg/kg/vücut ağırlığı dozunda günde iki defa olmak üzere 3 - 5 gün süreyle kullanılır. (20 kg vücut ağırlığı için 1 ml ürün, günde 2 kere, 3 - 5 gün süreyle kullanılır. İlaçlı su 24 saatte bir yenilenmelidir. Eğer hastalık semptomlarında 3 - 5 gün içerisinde değişim olmaz ise teşhis yeniden değerlendirilmeli ve tedavi değiştirilmelidir. Düşük doz uygulanmasından kaçınmak için hayvanların ağırlıkları mümkün olduğunca doğru hesaplanmalıdır. İlaçlı suyun hayvanlar tarafından alımı klinik durum, yaş, cinsiyet, ortam sıcaklığına göre değişebilmektedir. Bu nedenle doğru dozun sağlanabilmesi için ilaçlı suyun konsantrasyonunun ayarlanması gerekebilir. Uygun kalibre ağırlık ölçüm ekipmanlarının kullanımı tavsiye edilir. Tedavi edilmesi düşünülen tüm hayvanların ilaçlı su kaynaklarına rahatça erişebildiğinden emin olunmalıdır. Tedavi süresince ilaçlı su hayvanların tek su kaynağı olmalıdır.

NEOMİVET

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Oral Çözelti Tozu



BİLEŞİMİ: Neomivet Oral Çözelti Tozu, 1 g 'da 500 mg neomisin baza eşdeğer neomisin sülfat içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Neomivet Oral Çözelti Tozu, kuzu, buzağı, oğlak, tavuk ve hindilerde kullanılır. Neomisine duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sindirim sistemi enfeksiyonlarının tedavisi.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Tavuk ve hindilerde içme suyuna katılarak, buzağı, kuzu ve oğlaklarda su veya süt ile karıştırılarak ağız yolu ile uygulanır.

Buzağı, kuzu, oğlak

20-30 mg/kg vücut ağırlığı/gün dozunda (her 20 kg vücut ağırlığı için günde ortalama 1 gram toz) uygulanır. Dozun ikiye bölünerek sabah ve akşam uygulanması tavsiye edilir. Tedavi süresi 3-5 gündür. İlaçlı su/süt derhal tüketilmelidir.

Tavuk ve hindi

20-30 mg/kg vücut ağırlığı/gün dozunda (her 100 kg vücut ağırlığı için günde ortalama 5 gram toz) uygulanır. Tedavi süresi 3-5 gündür. Doğru dozaj için tüm türlerde vücut ağırlığı mümkün olduğunca doğru hesaplanmalıdır. İlaçlı suyun alımı bakım besleme koşulları, ırk, yaş, çevre şartları ve enfeksiyon durumuna göre değişebilir. Bu nedenle doğru doz sağlanabilmesi için ilaçlı suyun konsantrasyonunun ayarlanması gerekebilir. Uygun kalibre ağırlık ölçüm ekipmanlarının kullanımı tavsiye edilir. Tedaviye 3 gün içinde yanıt alınmazsa, yaklaşım yeniden değerlendirilmelidir. İlaçlı su derhal tüketilmelidir.

PENOKSAL

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Enjeksiyonluk Süspansiyon



BİLEŞİMİ: Penoksal Enjeksiyonluk Süspansiyon, çalkalandığında beyaz renkli, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk süspansiyon olup, 1 ml'de, 200.000 IU prokain penisilin G, 250 mg dihidrostreptomisin sülfat içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Sığır, at, koyun, köpek ve kedilerde kombinasyona duyarlı aşağıdaki mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen solunum, sindirim, ürogenital sistem ve diğer yumuşak doku enfeksiyonların tedavisi;

Arcanobacterium pyogenes
Erysipelothrix rhusiopathiae
Klebsiella pneumoniae
Listeria spp
Mannheimia haemolytica
Pasteurella multocida
Staphylococcus spp (penisilinaz üretmeyen)
Streptococcus spp
Salmonella spp

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Kullanımdan önce iyice çalkalayınız. Derin kas içi uygulanır.

Sığır, Koyun ve At: 8 mg/kg vücut ağırlığı benzil penisilin prokain ve 10 mg/kg vücut ağırlığı dihidrostreptomisin sülfat dozunda, pratik olarak her 25 kg canlı ağırlık için 1 ml uygulanır. Bu doz günlük doz olup, 3 gün boyunca uygulanmalıdır. Atlarda bir bölgeye en fazla 15, sığırlarda 6, koyunlarda 3 ml uygulanmalıdır.

Kedi, Köpek: 8-20 mg/kg vücut ağırlığı benzil penisilin prokain ve 10-25 mg/kg vücut ağırlığı dihidrostreptomisin sülfat dozunda, pratik olarak her 5 kg canlı ağırlık için 0,5 ml uygulanır. Bu doz günlük doz olup, 3-5 gün boyunca uygulanmalıdır.

PENOKSAL LA

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Enjeksiyonluk Süspansiyon



BİLEŞİMİ: Penoksal-LA Enjeksiyonluk Süspansiyon, çalkalandığında beyaz renkli, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk süspansiyon olup, 1 ml'de, 100.000 IU prokain penisilin G, 100.000 IU benzatin penisilin G, 200 mg dihidrostreptomisin baz (sülfat tuzu olarak) içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Penoksal-LA Enjeksiyonluk Süspansiyon, sığır, at, koyun ve köpeklerde duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sistemik ve lokal enfeksiyonlarda, sindirim, solunum ve üriner sistem enfeksiyonlarında ve sekonder bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; **Pratik doz:** 1 ml/20 kg canlı ağırlık dozda/gün dozda kas içi yolla uygulanır.

Sığır-At	(400 kg canlı ağırlığa)	20 ml
Dana-Düve	(200 kg canlı ağırlığa)	10 ml
Buzağı-Tay	(100 kg canlı ağırlığa)	5 ml
Koyun	(40 kg canlı ağırlığa)	2 ml
Köpek	(10 kg canlı ağırlığa)	0,5 ml

Genelde tek doz yeterli olup, gerektiğinde 3 gün ara ile ikinci bir doz uygulanabilir. Kullanmadan önce şişeyi kuvvetlice çalkalayarak, süspansiyon homojen hale getirilmelidir. Damar içi uygulanması kontrendikedir. Kullanırken asepti ve antisepsiye uyulmalıdır. Özellikle atlarda olmak üzere aynı bölgeye tekrarlayan enjeksiyonlardan kaçınılmalıdır.

PRİMAFUL

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Enjeksiyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: Primaful Enjeksiyonluk Çözelti, sarıdan amber rengine kadar değişen renkte, berrak, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk çözelti olup, 1 ml'de 300 mg. oksitetrasiklin baza eşdeğer miktarda oksitetrasiklin dihidrat ile 20 mg fluniksine eşdeğer fluniksin meglumin içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Sığırlarda, antienflamatuvar ve antipiretik etkinin de gerekli olduğu, oksitetrasikline duyarlı Mannheimia (Pasteurella) haemolytica ve Pasteurella multocida suşları tarafından meydana getirilen akut solunum sistemi enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Derin kas içi yolla uygulanır.

Tavsiye edilen doz 2 mg/kg fluniksin ve 30 mg/kg oksitetrasiklin (her 10 kg vücut ağırlığı için 1 ml) dir.

Bu ürün sadece tek enjeksiyon olarak tavsiye edilir. Bir enjeksiyon bölgesine en fazla 15 ml ürün uygulanmalıdır.

Doğru doz için hayvanların ağırlığı mümkün olduğunda doğru ölçülmelidir.

PRİMAVİLİN

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Enjeksiyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: Primavilin Enjeksiyonluk Çözelti, sarıdan amber rengine kadar değişen renkte, berrak, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk çözelti olup, 1 ml'de 100 mg. oksitetrasiklin baza eşdeğer oksitetrasiklin hidroklorür içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Sığır, koyun, keçi, atlarda oksitetrasikline duyarlı mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen sepsis, solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonları ve interdigital panaris tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Ven içi, kas içi, deri altı veya periton içi yolla kullanılır. Hedef türlerde 5-10 mg/kg oksitetrasiklin/gün dozunda 3-5 gün süre ile kullanılır. Pratik olarak her 20 kg vücut ağırlığına günde 1-2 ml kullanılır. Sığırlarda 10, koyun ve keçilerde 5 ml'den fazla aynı bölgeye enjekte edilmemelidir.

PRİMAVİLİN LA

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Enjeksiyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: Primavilin-LA Enjeksiyonluk Çözelti, sarıdan amber rengine kadar değişen renkte, berrak, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk çözelti olup, 1 ml'de 200 mg. oksitetrasiklin baza eşdeğer oksitetrasiklin dihidrat içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Sığır, koyun, keçilerde oksitetrasikline duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sistemik enfeksiyonların, solunum sisteme enfeksiyonlarının veya bölgesel enfeksiyonların tedavisinde tedavisinde kullanılır. Örneğin;

Sığır: Mannheimia haemolytica ve Pasteurella multocida tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonları, Trueperella pyogenes, Escherichia coli ve Staphylococcus aureus tarafından meydana getirilen umbilikal enfeksiyonlar ve septik artrit, Trueperella pyogenes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae ve Streptococcus uberis tarafından meydana getirilen klinik mastit Escherichia coli tarafından meydana getirilen metrit

Koyun-keçi: Mannheimia haemolytica ve Pasteurella multocida tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonları, Trueperella pyogenes ve Escherichia coli tarafından meydana getirilen umbilikal enfeksiyonlar ve septik artrit, Trueperella pyogenes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus tarafından meydana getirilen klinik mastit, Erysipelothrix rhusiopathiae tarafından meydana getirilen Erisipelas, Chlamydophila abortus tarafından meydana getirilen enzootik abortusun metafilaksisi ve tedavisinde kullanılır

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Derin kas içi yolla uygulanır. Tavsiye edilen doz 20 mg/kg vücut ağırlığı (her 10 kg vücut ağırlığı için 1 ml)dir. Bu ürün sadece tek enjeksiyon olarak tavsiye edilir. Bir enjeksiyon bölgesine sığırda 20, keçi ve koyunda 5 ml'den fazla uygulanmamalıdır. Doğru doz için hayvanların ağırlığı mümkün olduğunda doğru ölçülmelidir. Bir enjeksiyondan sonra sığırlarda 72 saat, koyunlarda 48 saat boyunca etkili kan yoğunluğu elde edilir.

PRİMAVİLİN AQUA

Veteriner İlaçlı Premiks



Oral Toz

BİLEŞİMİ: PRİMAVİLİN AQUA Oral toz/Veteriner İlaçlı Premiks, açık sarı renkte bir toz olup, 1 g' da 755 mg oksitetrasiklin hidroklorür içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: PRİMAVİLİN AQUA Oral toz/Veteriner ilaçlı Premiks, başlıca tatlı ve tuzlu su balıklarında (çipura, levrek, mercan) hastalıklara neden olan birçok Gram pozitif ve Gram negatif bakterilere karşı etkilidir. Özellikle alabalıklarda bakteriyel hemorajik septisemi (*Aeromonas hydrophila*, *Pseudomonas* sp.), kolumnaris hastalığı (*Flexibacter columnaris*), kızıl ağız hastalığı (*Yersinia nickerii*), Streptokokal hastalıklar (*P. hemolitik* ve hemolitik olmayan streptococ sp.), Soğuk su Vibriyozisi (*Vibrio nguillanım*), Soğuk su hastalığı, *Cytophaga psycrophila*'nın neden olduğu Yavru gökkuşağı alabalık sendromu, *Pseudomonas* septisemi (winter disease), Ülser hastalığı (*Haemeophylus piscium*) gibi hastalıklarda başarıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:

PRİMAVİLİN AQUA yem ile karıştırılarak oral olarak kullanılır.

	Genel Enfeksiyonlar	Yavru gökkuşağı alabalık sendromu
Etken madde miktarı, beher kilogram balık için	75 mg / kg c.a.	200 mg / kg c.a.
Toz miktarı, beher kilogram balık için	0.1 g / kg c.a.	0.27 g / kg c.a.
Beden ağırlığının % 1'inin yem istihkakı için, beher kilogram yem için, PrimaVilin Aqua toz miktarı	10 g	27 g

PRİMAVİLİN AQUA

Veteriner İlaçlı Premiks

Oral Toz



Farmakolojik doz: 75 mg/kg canlı ağırlık etken madde olacak şekilde balık yemlerine karıştırılmak suretiyle uygulanır.

Pratik doz: 0,1 g/ kg canlı ağırlık olarak oral toz olarak balık yemlerine karıştırmak suretiyle uygulanır. PRİMAVİLİN AQUA Oral toz/Veteriner İlaçlı Premiks, 7 gün boyunca verilir. Yavru gökkuşağı alabalık sendromunda 20 güne kadar verilir.

Balık Yeminin Oranı (Canlı Ağırlığa Göre) (%)	1 Ton Yeme İlave edilecek Primavilin Aqua Oranı (kg)	Her 1 ton yem için bulunması gerekli Oksitetrasiklin HCl miktarı (kg)
1	10	7.55
2	5	3.77
3	3.3	2.52
5	2	1.51
10	1	0.755

Mikser veya yem karıştırıcısına (temiz, kuru ve hassas olmalı), daha önceden tartılmış olan PRİMAVİLİN AQUA miktarı mikser konur ve karıştırma işlemi devam ederken %1 oranında yağ, sprey şeklinde püskürtülür. Karıştırmaya 2,5 dakika daha devam ettikten sonra homojen hale gelen yem ilaç karışımı kullanıma hazırlanmış olur. İlaçlı yem verilmeden önce balıklar 12 - 24 saat aç bırakılmalıdır. İlaçlı yem oranı suyun sıcaklığına ve balıkların büyüklüğüne göre değişebilir.

SPİRAVİL

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Enjeksiyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: Spiravil Enjeksiyonluk Çözelti, açık sarı renkte, berrak, steril enjeksiyonluk çözelti olup, 1 ml'de 600 000 IU spiramisin içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: SPİRAVİL Enjeksiyonluk Çözelti, sığırlarda spiramisine duyarlı mikro- organizmaların yol açtığı mastitislerde (Streptococcus sp, Staphylococcus sp. ve Mycoplasma sp.'lerin neden olduğu), ayak çürüğü, solunum sistemi enfeksiyonlarından (Pasteurella sp. ve Mycoplasma sp. kaynaklı) enzootik pneomonilerin sağaltımında, artiritis, metritis, enteritis ve Ompahaloflebitis ve Omphalitis'lerin sağaltımında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Farmakolojik doz: Yetişkin sığırlar için 30 000 IU Spiramisin/kg canlı ağırlık dozunda, tek doz olarak, derin kas içi yolla uygulanır.

Pratik doz: 1 ml/20 kg canlı ağırlık dozunda hesaplanır.

Farmakolojik doz: Buzağılar için 75 000 IU Spiramisin/kg canlı ağırlık dozunda, tek doz olarak, derin kas içi yolla uygulanır.

Pratik doz: 2,5 ml/20 kg canlı ağırlık dozunda hesaplanır. Gerekli görüldüğü takdirde 24 saat sonra doz tekrarlanabilir.

TAVİLİN 200

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Enjeksiyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: Tavilin 200 Enjeksiyonluk Çözelti, 1 ml'sinde 200 mg Tilosin baz içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:

Sığır (erişkin)

Gram pozitif bakteriler tarafından meydana getirilen metritis, solunum sistemi enfeksiyonları, Streptococcus spp., Staphylococcus spp. tarafından meydana getirilen mastitis ve Fusobacterium necrophorum tarafından meydana getirilen interdigital necrobacillosis tedavisi,

Buzağı

Necrobacillosis (Fusobacterium necrophorum) ve solunum sistemi enfeksiyonları

Koyun-keçi

Gram pozitif bakteriler tarafından meydana getirilen metritis, solunum sistemi enfeksiyonları, Gram pozitif bakteriler veya Mycoplasma spp. tarafından meydana getirilen mastitis,

Köpek

Duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonları ve otitis

Kedi

Duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonlarında kullanılır

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Kas içi ve yalnızca sığırlarda aynı zamanda yavaş ven içi yolla uygulanır.

Sığır: 5-10 mg/kg vücut ağırlığı/gün dozunda 3 gün boyunca uygulanır (her 100 kg vücut ağırlığı için günde 2,5-5 ml). Bir enjeksiyon bölgesine en fazla 15 ml uygulanmalıdır.

Koyun-keçi: 10 mg/kg vücut ağırlığı/gün dozunda 3 gün boyunca uygulanır (her 50 kg vücut ağırlığı için günde 2,5 ml).

Kedi-köpek: 7-11 mg/kg vücut ağırlığı/gün dozunda 3-5 gün boyunca uygulanır (10 kg vücut ağırlığı için günde 0,35-0,55 ml). Düşük miktarlar için doğru dozajlama yapabilecek uygun enjektör kullanılmalıdır.

TAVİLİN

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Oral Çözelti Tozu



BİLEŞİMİ: Tavilin Oral Çözelti Tozu, beyaz açık sarı renkli bir tozdur ve her 1.1 gram ürün, 1 gram tilozin aktivitesine eşdeğer 1.1 gram tilozin tartarat içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:

Buzağı: Mycoplasma sp. tarafından meydana getirilen pneumonilerin tedavisi ve metaflaksisi (hastalık başlamış sürülerde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla)

Tavuk: Mycoplasma gallisepticum ve Mycoplasma synoviae tarafından meydana getirilen CRD enfeksiyonlarının tedavisi ve metaflaksisi Hastalık teşhis edilen sürülerde Clostridium perfringens tarafından meydana getirilen nekrotik enteritisin tedavisi ve önlenmesi

Hindi: Mycoplasma gallisepticum tarafından meydana getirilen infeksiyöz sinüzitisin tedavisi ve metaflaksisi

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: İçme suyuna katılarak uygulanır. Buzağılarda ayrıca süt veya süt ikamesi ile de verilebilir. Oral olarak kullanılır.

Buzağı: 20-40 mg/kg tilozin vücut ağırlığı/gün dozunda (her kg vücut ağırlığı için 22-44 mg ürün), 7-14 gün süre ile uygulanır. Günlük doz sabah-akşam olmak üzere ikiye bölünerek uygulanır.

Hindi: 75-100 mg/kg tilozin vücut ağırlığı/gün dozunda (her kg vücut ağırlığı için 82,5-110 mg ürün) 3-5 gün süre ile uygulanır.

Tavuk: CRD tedavisinde 75-100 mg/kg tilozin vücut ağırlığı/gün dozunda (her kg vücut ağırlığı için 82,5-110 mg ürün) 3-5 gün süre ile uygulanır.

Nekrotik enteritte: 20 mg/kg tilozin vücut ağırlığı/gün dozunda (her kg vücut ağırlığı için 22 mg ürün) 3 gün uygulanır.

Tedavi süresinde ilaçlı sudan başka hayvanlara başka su verilmemelidir. Yeterli ilaçlı su tüketimini sağlamak için hayvanların ilaçlı suya rahat erişimine dikkat edilmelidir.

Tedaviye 3 gün içerisinde cevap alınamazsa yaklaşım yeniden değerlendirilmelidir.

VİLAMOKS-LA

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Enjeksiyonluk Süspansiyon



BİLEŞİMİ: Vilamoks-LA Enjeksiyonluk Süspansiyon, çalkalandığında hafif grimsi-beyaz renkli, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk süspansiyon olup, 1 ml'de 150 mg Amoksisilin baza eşdeğer Amoksisilin trihidrat içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Sığır, koyun, keçi, köpek, kedilerde amoksisiline duyarlı Gram pozitif ve Gram negatif bakteriler tarafından meydana getirilen solunum, sindirim, ürogenital sistemleri ile deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Clostridium spp.

Corynebacterium spp.

Erysipelas spp.

Fusiformis spp.

Haemophilus spp.

Pasteurella spp.

Streptococci spp.

Salmonella spp.

Staphylococci

Mannheimia haemolytica

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Kuru, steril iğne ve enjektör kullanınız. Endike olduğu hayvanlarda 15 mg/kg vücut ağırlığı dozunda (pratik olarak 1 ml ürün/10 kg vücut ağırlığı için) uygulanır. 48 saat sonra enjeksiyon tekrarlanmalıdır. Doğru miktarda ürün verilmesini sağlamak için hayvanların ağırlığı mümkün olduğunca doğru ölçülmelidir.

Sığır, koyun ve keçilerde derin kas içi yolla, kedi ve köpeklerde kas içi veya deri altı uygulanır. Özellikle küçük dozda ürün kullanılacaksa gerekli miktarın hayvana enjekte edildiğinden emin olunacak şekilde uygun iğne kullanılmalıdır. Enjeksiyondan sonra enjeksiyon bölgesine masaj yapılmalıdır.

Diğer enjeksiyonluk ürünlerde olduğu gibi aseptik önlemler alınmalıdır.

İkinci uygulamadan sonra da klinik olarak cevap alınamadığı durumlarda teşhis gözden geçirilmeli ve gerekliyse tedavi değiştirilmelidir.

VİLAMOKS 80

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Oral Çözelti Tozu



BİLEŞİMİ: 1 gramında 800 mg Amoksisilin trihidrat içeren, beyaz veya beyaza yakın renkli antibakteriyel oral çözelti tozudur.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Buzağı (henüz geviş getirmeyen), tavuk, hindi ve ördeklere amoksisiline duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Tavuk, hindi ve ördek içme suyuna katılarak kullanılır. İlaçlı su temiz su ile kullanımdan hemen önce hazırlanmalıdır. 12 saatte kullanılmayan ilaçlı su atılmalı ve ilaçlı su yenilenmelidir. İlaçlı su tedavi anında hayvanların tek içme suyu kaynağı olmalıdır. Ancak ilaçlı su kısa sürede tüketilirse normal su tedarikine devam edilebilir. İlaçlı suyun verilmesinden 2 saat öncesinden (sıcak havalarda daha kısa olabilir) itibaren hayvanlar susuz bırakılmalıdır. Ürünün suda tamamen dağıldığından emin olunmalıdır.

Tavuk

Tavsiye edilen doz 15 mg/kg amoksisilin trihidrat/gündür (18,75 mg/kg ürün/gün). Pratik olarak her 1000 kg vücut ağırlığı için günde 18,75 gram ürün içme suyuna katılarak kullanılır. Tedavi süresi 3 gün, şiddetli enfeksiyonlarda 5 gündür.

Hindi

Tavsiye edilen doz 15-20 mg/kg amoksisilin trihidrat/gündür (18, 75-25 mg/kg ürün/gün). Pratik olarak her 1000 kg vücut ağırlığı için günde 18, 75-25 gram ürün içme suyuna katılarak kullanılır. Tedavi süresi 3 gün, şiddetli enfeksiyonlarda 5 gündür.

VİLAMOKS 80

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Oral Çözelti Tozu



Ördek

Tavsiye edilen doz 20 mg/kg amoksisilin trihidrat/gündür (25 mg/kg ürün/gün). Pratik olarak her 1000 kg vücut ağırlığı için günde 25 gram ürün içme suyuna katılarak kullanılır. Tedavi süresi 3 gündür. İlaçlı suyun hazırlanmasında tedavi edilecek hayvanların vücut ağırlığı ve günlük su tüketimleri doğru hesaplanmalıdır. Su tüketimi ırk, yaş, bakım koşulları, sağlık durumu gibi faktörlere göre değişebilmektedir. Doğru dozaj için bu hususlar mutlak göz önüne alınmalıdır. Tedavi bitiminde su sistemi sub-terapotik doza neden olmamak için mutlaka temizlenmelidir.

Buzağı

Su, süt veya süt ikame yemine katılarak kullanılır. Tavsiye edilen doz 12 mg amoksisilin trihidrat/kg/gün vücut ağırlığıdır. Günlük doz sabah ve akşam ikiye bölünerek verilir. Tedavi süresi 5 gündür. İlk 48 saatte iyileşme görülmezse teşhis ve tedavi gözden geçirilmelidir. Pratik olarak sabah ve akşam her 65 kg vücut ağırlığına 0,5 gram ürün kullanılır. İlaçlı su/süt/süt ikamesi her kullanımdan önce taze olarak hazırlanmalıdır.

VİL-FLOKS

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Enjeksiyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: Vil-floks Enjeksiyonluk Çözelti, hafif sarı renkli, berrak, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk çözelti olup, 1 ml'de 100 mg. Enrofloksasin baz içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:

Sığır

Enrofloksasine duyarlı;

- Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica ve Mycoplasma spp. suşları tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonları tedavisi,
- Escherichia coli suşları tarafından meydana getirilen akut ciddi mastitis tedavisi,
- Escherichia coli suşları tarafından meydana getirilen sindirim sistemi enfeksiyonları tedavisi
- Escherichia coli suşları tarafından meydana getirilen septisemi tedavisi
- 2 yaşın altındaki sığırlarda enrofloksasine duyarlı Mycoplasma bovis suşları tarafından meydana getirilen Mycoplasma ilişkili akut artiritis tedavisi,

Koyun

Enrofloksasine duyarlı;

- Escherichia coli suşları tarafından meydana getirilen sindirim sistemi enfeksiyonları tedavisi,
- Escherichia coli suşları tarafından meydana getirilen septisemi tedavisi,
- Staphylococcus aureus ve Escherichia coli tarafından meydana getirilen mastitis tedavisi

Keçi

Enrofloksasine duyarlı;

- Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica suşları tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonları tedavisi,
- Escherichia coli suşları tarafından meydana getirilen sindirim sistemi enfeksiyonları tedavisi,
- Escherichia coli suşları tarafından meydana getirilen septisemi tedavisi,
- Staphylococcus aureus ve Escherichia coli tarafından meydana getirilen mastitis tedavisinde kullanılır

VİL-FLOKS

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Enjeksiyonluk Çözelti



KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Tekrarlayan enjeksiyonları farklı noktalara yapınız.

Düşün doz verilmesinden kaçınmak için vücut ağırlığı mümkün olduğunca doğru hesaplanmalıdır.

Siğir

5 mg/kg vücut ağırlığı/gün dozunda (1 ml/20 kg vücut ağırlığı) günde bir kere 3-5 gün uygulanır. 2 yaşın altındaki siğirlarda Mycoplasma kökenli akut artiritte 5 gün uygulanır.

Yavaş ven içi veya deri altı yolla uygulanır.

Escherichia coli kaynaklı akut mastitiste 5 mg/kg vücut ağırlığı/gün dozunda (1 ml/20 kg vücut ağırlığı) yavaş ven içi günde bir kere iki gün uygulanır. İkinci doz deri altı yolla uygulanabilir. Bu durumda kalıntı süresi deri altı uygulamaya göre belirlenir.

Bir enjeksiyon bölgesine 10 ml'den fazla uygulamayınız.

Koyun-Keçi

5 mg/kg vücut ağırlığı/gün dozunda (1 ml/20 kg vücut ağırlığı) günde bir kere 3 gün, deri altı yolla uygulanır.

Bir enjeksiyon bölgesine 6 ml'den fazla uygulamayınız.

GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE KULLANIM:

Siğir

Bu ürün gebeliğin ilk çeyreğinde kullanılabilir. Ancak gebeliğin son 3 çeyreğinde kullanımı veteriner hekimin fayda/risk değerlendirmesine bağlıdır. Ürünün laktasyon döneminde kullanımında sakınca yoktur.

Koyun- Keçi

Bu ürünün gebelik ve laktasyon dönemlerinde kullanımının güvenilirliği çalışılmamıştır. Bu nedenle veteriner hekimin fayda/risk değerlendirmesine bağlı olarak kullanılmalıdır.

VİL-FLOKS

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Oral Çözelti



BİLEŞİMİ: Vil-floks Oral Çözelti, hafif sarı renkli, berrak, kullanıma hazır, oral çözelti olup, 1 ml'de 100 mg. Enrofloksasin baz içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Enrofloksasin'e duyarlı aşağıdaki bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde:

Tavuklar

Mycoplasma gallisepticum,
Mycoplasma synoviae,
Avibacterium paragallinarum,
Pasteurella multocida,

Hindiler

Mycoplasma gallisepticum,
Mycoplasma synoviae,
Pasteurella multocida,

Tavşanlar

E.coli enfeksiyonuna bağlı bakteriyel enterit ve Pasteurella multocida 'ya bağlı enfeksiyöz hastalıkların tedavisinde kullanılır

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Tavuk ve hindi

Günlük 10 mg/kg vücut ağırlığı dozunda içme suyuna karıştırılarak enfeksiyonun şiddetine göre birbirini izleyen 3 - 5 gün boyunca verilir. Miks enfeksiyonlar ve kronik progresif formlarda ise birbirini izleyen 5 gün boyunca uygulanmalıdır.

Eğer 2 - 3 gün içinde herhangi bir klinik iyileşme sağlanamazsa duyarlılık testinin sonucuna göre alternatif antimikrobiyel tedavi göz önünde bulundurulmalıdır.

VİL-FLOKS

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Oral Çözelti



Verilen dozun tamamının tüketildiğinden her zaman emin olunmalıdır. İlaçlı su, her gün taze olarak ve hayvanlara verilmeden hemen önce hazırlanmalıdır.

Tedavi süresince hayvanların başka bir su kaynağından su içmelerine izin verilmemelidir. Az doz uygulamaktan kaçınmak için hayvanların vücut ağırlığı mümkün olduğu kadar doğru hesaplanmalıdır. Düzgün ilaçlamanın sağlanması için pompalama sistemleri sürekli olarak kontrol edilmelidir. Tedaviye başlamadan önce su sistemi boşaltılmalı ve ilaçlı su ile doldurulmalıdır.

Tavşan

10 mg/kg vücut ağırlığı/gün dozda 5 ardışık gün

VİLFLOKS %20

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Oral Çözelti



BİLEŞİMİ: Vifloks %20 Oral Çözelti; açık sarı renkli berrak çözelti olup, her ml'sinde 200 mg Enrofloksasin ve koruyucu olarak 7,5 mg Benzil alkol içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Enrofloksasin'e duyarlı aşağıdaki bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde:

Tavuklar

Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Avibacterium paragallinarum, Pasteurella multocida,

Hindiler

Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Pasteurella multocida,

Tavşanlar

E.coli enfeksiyonuna bağlı bakteriyel enterit ve Pasteurella multocida 'ya bağlı enfeksiyöz hastalıkların tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Tavuk ve hindi

Günlük 10 mg/kg vücut ağırlığı dozunda içme suyuna karıştırılarak enfeksiyonun şiddetine göre birbirini izleyen 3 - 5 gün boyunca verilir. Miks enfeksiyonlar ve kronik progresif formlarda ise birbirini izleyen 5 gün boyunca uygulanmalıdır. Eğer 2 - 3 gün içinde herhangi bir klinik iyileşme sağlanamazsa duyarlılık testinin sonucuna göre alternatif antimikrobiyel tedavi göz önünde bulundurulmalıdır. Verilen dozun tamamının tüketildiğinden her zaman emin olunmalıdır. İlaçlı su, her gün taze olarak ve hayvanlara verilmeden hemen önce hazırlanmalıdır. Tedavi süresince hayvanların başka bir su kaynağından su içmelerine izin verilmemelidir. Az doz uygulamaktan kaçınmak için hayvanların vücut ağırlığı mümkün olduğu kadar doğru hesaplanmalıdır. Düzgün ilaçlamanın sağlanması için pompalama sistemleri sürekli olarak kontrol edilmelidir. Tedaviye başlamadan önce su sistemi boşaltılmalı ve ilaçlı su ile doldurulmalıdır. Tedavi süresince gereken

VİLFLOKS %20

Veteriner Sistemik Antibakteriyel



Oral Çözelti

günlük ürün miktarı (ml) aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Toplam kanatlı hayvan sayısı $\times$ Ortalama vücut ağırlığı (kg) $\times$ 0.05 ml = Günlük toplam hacim (ml) İlaçlı suyun hayvanlar tarafından alımı klinik durum, yaş, cinsiyet, ortam sıcaklığına göre değişebilmektedir. Bu nedenle doğru dozun sağlanabilmesi için ilaçlı suyun konsantrasyonunun ayarlanması gerekebilir. Uygun kalibre ağırlık ölçüm ekipmanlarının kullanımı tavsiye edilir.

Tavşan

10 mg/kg vücut ağırlığı/gün dozda 5 ardışık gün

Tedavi süresince gereken günlük ürün miktarı (ml) aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Toplam tavşan sayısı $\times$ Ortalama vücut ağırlığı (kg) $\times$ 0.05 ml = Günlük toplam hacim (ml)

OPTİVİL

Veteriner Topikal Antibakteriyel

Göz Merhemi



BİLEŞİMİ: OPTİVİL Göz Merhemi, krem beyaz renkli bir krem olup, beher gramda 213 mg kloksasilin benzatin içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: OPTİVİL Göz Merhemi, At, sığır, koyun, kedi ve köpeklerin göz enfeksiyonlarının tedavisinde lokal olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde,

Pratik Doz

Sığır ve At

Her bir göz için 5-10 cm şerit halinde alt göz kapağı açılarak konjunktival boşluğa sıkılır.

Koyun

Her bir göz için 5 cm şerit

Kedi ve Köpek için

Her bir göz için 2 cm şerit

Normal şartlarda tek doz uygulanması yeterlidir. Gerek görüldüğü takdirde 48-72 saat içinde tedavi tekrar edilebilir. Çapraz enfeksiyonun önüne geçmek amacıyla enfekte olmayan gözede tedavi yapılması önerilir. Enfeksiyon riskini önlemek için ilaçlamaya önce sağlam gözden başlanmalıdır. Sadece harici uygulanır.

Meme Sağlığı Ürünleri

Sayfa

ÜRÜNLER

48

Masticol DC

49

Mastivil

MASTİCOL DC

Veteriner Antibakteriyel

Kuru Dönem Meme İçi
Süspansiyonu



BİLEŞİMİ: Masticol-DC Meme İçi Süspansiyon, krem renkli, kullanıma hazır, steril süspansiyon olup, 1 tüpde 250 mg. ampisilin baza eşdeğer ampisilin trihidrat, 500 mg. kloksasilin baza eşdeğer kloksasilin benzatin içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI: Sığırlarda, laktasyonun son sağımından hemen sonra mevcut mastitisi tedavi etmek ve kuru dönemde başka enfeksiyonlara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır.

Mastitis ile ilişkili Gram-pozitif ve Gram negatif organizmalara karşı aktiftir ve Streptococcus agalactiae ve diğer Streptococcus türlerine, Penisiline dirençli ve hassas Staphylococci, Arcanobacterium spp, Escherichia coli ve diğer duyarlı Gram-negatif bakterilere karşı etkilidir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Düve ve süt veren ineklerde meme içine infüzyon şeklinde uygulanır. Son sağımdan sonra her bir memeye bir tüp olarak, meme ucu temizlendikten ve dezenfekte edildikten sonra uygulanmalıdır.

MASTİVİL

Veteriner Antibakteriyel

Laktasyon Dönemi Meme İçi Süspansiyonu



BİLEŞİMİ: Mastivil Meme İçi Süspansiyon, 5 g 'lık her 1 tüpte:

Prokain Penisilin G: 100.000 IU

Streptomisin sülfat: 100 mg

Neomisin sülfat: 100 mg

Prednizolon: 10 mg bulunur.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI: Mastivil Meme İçi Süspansiyon, süt ineklerinde laktasyon döneminde meydana gelen klinik mastitislerin sağaltımı için geliştirilmiş, geniş spektrumlu antibakteriyel bir preparattır. Penisilin, Streptomisin ve Neomisin'e duyarlı bakterilerden Streptococcus sp., Staphylococcus sp., E. coli, Klebsiella pneumoniae'nin neden olduğu laktasyon dönemi akut ve subakut klinik mastitislerin sağaltımında, ayrıca oluşan yangı ve ağrının giderilmesinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, Meme içi yolla, hasta meme lobuna bir tüp uygulanır. İlaç uygulaması yapılmadan önce hasta meme lobu sağılarak boşaltılır. Meme başı ve eller temizlenerek antiseptisi sağlanır. Daha sonra kanül kapağı çıkartılır. Mastivil meme içi süspansiyon'un kanülü meme başından dikkatlice sokularak tüp boşaltılır. Meme başı parmakla sıvanarak meme lobuna avuç ile ılımlı bir şekilde masajlar yapılarak ilaç içeriğinin meme dokusuna yayılması sağlanır. İlaç uygulanmasından sonra meme başı antiseptikli mendil ile yeniden temizlenir. Sağaltıma 24 saat ara ile 3 gün süre ile devam edilmelidir. Gerek görüldüğünde meme içi ilaç uygulamaları, sistemik antibiyotik uygulamaları ile desteklenmelidir. Uygulamadan 6 saat sonra sağım yapılmalıdır.

Antiparaziter Ürünler

Sayfa

ÜRÜNLER

51	Akarvil %1
53	Amprovil
54	Guadreks Oral
56	Guadreks
57	İmidovil
59	Levamin
60	Parvakuvil Enjeksiyon
61	Vilazol 1500
63	Vilmectin Enjeksiyon
65	Vilmectin FCL Enjeksiyon
67	Oksavet
68	Oksavil

AKARVİL %1

Veteriner İnsektisit - Akarisit

Dökme Çözelti



BİLEŞİMİ: Akarvil %1 Dökme Çözelti, sarımsı açık kahverengi çözelti, kullanıma hazır olup, 1 ml'de 10 mg Flumetrin içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Aşağıdaki parazitlerden kaynaklanan enfestasyonların önlenmesi ve tedavisi

Sığır

- Keneler (Ixodes, Amblyomma sp., Dermacentor, Boophilus sp., Hyalomma sp, Haemaphysalis ve Rhipicephalus)
- Bitler (Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Bovicola bovis)
- Uyuz (Chorioptes bovis, Sarcoptes bovis, Psoroptes ovis)

Koyun

Bit ve kene enfestasyonlarında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Ürün, kullanıma hazır olup, kullanmadan önce çalkalanmalıdır. Ürün hayvanların omurgası üzerine, omuzdan başlayarak kuyruk sokumuna kadar bir çizgi halinde uygulanır. Koyunlarda yapağının çok olması nedeniyle, omurga çizgisini ortaya çıkaracak şekilde yapağı elle ayrılarak uygulanmalıdır.

Yağmurun ürünün ilk etkinliği üzerine olumsuz bir etkisi yoktur ancak uygulamadan sonraki etkinliğini kısaltabilir.

Uygulama dozu sığır ve koyunlarda kene mücadelesi için 1 mg/kg, uyuz ve bit mücadelesinde 2 mg/kg vücut ağırlığı şeklindedir.

AKARVİL %1

Veteriner İnsektisit - Akarisit



Dökme Çözelti



Pratik doz tablosu:

SIĞIR	
Canlı ağırlık (kg)	Doz (ml)
100	10
200	20
300	30
400	40
500	50

KOYUN	
Canlı ağırlık (kg)	Doz (ml)
10	1
15	1,5
20	2
30	3
40	4
50	5

Birbirine temas eden ya da edebilecek tüm hayvanlara ürün uygulanmalıdır. Genellikle tek uygulama tedavi için yeterlidir. Ciddi uyuz enfestasyonu söz konusu ise iki hafta sonra tedavi tekrar edilmelidir. Kenelere karşı etki süresi yaklaşık üç haftadır.

AMPROVİL

Veteriner Antikoksidial

Oral Çözelti



BİLEŞİMİ: Amprovil Oral Çözelti; sarı – açık sarı renkli berrak çözelti olup, her ml'sinde 200 mg Amprolyuma eş değer Amprolyum hidroklorür ve koruyucu olarak 1 mg Metil paraben içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Tavuk ve hindilerde duyarlı Eimeria spp. tarafından meydana getirilen intestinal coccidiosis tedavisi için kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: İçme suyuna katılarak kullanılır. Tavuk ve hindilerde 20 mg amprolyum/kg vücut ağırlığında 5-7 gün süre ile kullanılır. İlaçlı suyun hazırlanmasında, tedavi edilecek hayvanların vücut ağırlıkları ve gerçek günlük su tüketimi dikkate alınmalıdır. Tüketim, yaş, sağlık durumu, cins, çevre sıcaklığı, hayvancılık sistemi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Litre içme suyu başına ml cinsinden gerekli veteriner tıbbi ürün miktarını sağlamak için aşağıdaki hesaplama yapılmalıdır:

$$\frac{0.1 \times \text{Tedavi edilecek hayvanların ortalama ağırlığı (kg)}}{\text{Bir önceki gün tedavi edilecek hayvanların tükettiği su miktarı (Litre)}} \times \text{Tedavi edilecek hayvan sayısı} = \text{Her litre suya karıştırılması gereken ürün miktarı (mL olarak)}$$

Yeterli su tüketimini sağlamak için tedavi edilecek hayvanlar için su temini sistemine yeterli erişim sağlanmalıdır. İlaç tedavisi süresince başka hiçbir içme suyu kaynağı bulunmamalıdır. İlaçlı içme suyu 24 saatte bir değiştirilmelidir. İlaç süresinin bitiminden sonra, etkin maddenin sub-terapotik miktarlarda alımı önlemek için su tedarik sistemi uygun şekilde temizlenmelidir.

GUADREKS

Veteriner Antihelmintik

Oral Tablet



BİLEŞİMİ: Her 1 tablet 250 mg Praziquantel içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Guadrex Tablet, koyun, at, köpek ve kedilerde şerit (cestod) ve bazı kelebek (trematod) enfestasyonlarının sağaltımı ve kontrolü amacıyla kullanılır. Koyunlarda *Coenurus cerebralis* isimli parazitin sebep olduğu hastalık belirtilerini ortadan kaldırmak amaçlı kullanılır. Guadrex Tablet'in hayvan türlerine göre etkili olduğu parazit türleri:

Koyunlarda - Şeritler: *Moniezia* sp., (özellikle *M. expansa*, *M. benedeni*), *Stilesia* sp. (özellikle *S. globipunctata*), *Avitellina* sp., *Coenurus cerebralis*, *Cysticercus tenuicollis*, *Thysanezia* sp., (özellikle *T. giardi*).

Kelebekler: *Dicrocoelium dendriticum*, *Schistosoma* sp., *Orientobilharzia* sp..

Atlarda - Şeritler: *Anaplocephala* sp., *Paranoplocephala mamillana*

Köpek ve kedilerde - Şeritler: *Dipylidium caninum*, *Taenia* sp. (özellikle *T. pisiformis*, *T. hydatigena*, *T. ovis*, *T. serialis*, *T. taeniaformis*), *Ecinococcus* sp. (özellikle *E. granulosus*, *E. multilocularis*), *Mesocostoides* sp, *Diphylobotrium* sp., *Spirometra* sp., (özellikle *S. erinacei*), *Joyeuxiella* sp. (özellikle *J. pasqualei*), *Diphylobotrium latum*, *Multiceps multiceps*.

Kelebekler: *Paragonimus* sp., (özellikle *P. kellyi*), *Opistorchis* sp

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde,

Farmakolojik doz: Koyunlarda 5-10 mg/kg.ca, köpek ve kedilerde 7,5-15 mg/kg.ca, atlarda 1mg/kg. ca dozunda, oral yolla kullanılır.

GUADREKS

Veteriner Antihelmintik

Oral Tablet



Pratik doz:

Kuzu (25 kg'dan az)	½ tablet
Kuzu (25 kg'dan fazla)	1 tablet
Koyun	1 - 1½ tablet
Koç (60 kg'dan fazla)	2 tablet
Tay	½ - 1 tablet
At	1 - 2 tablet
Köpek (15 kg'dan az)	½ tablet
Köpek (15-25 kg arası)	1 tablet
Köpek (40 kg'dan fazla)	2 tablet
Kedi	½ tablet

Bazı parazitler hastalıklarının sağaltımında dozlar ve uygulama süreleri veteriner hekim tarafında belirlenebilir.

İMİDOVİL

Veteriner Antiprotozooner

Enjeksiyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: İMİDOVİL Enjeksiyonluk Çözelti, renksiz veya açık sarı renkli berrak bir çözelti olup, 1 ml'de 85 mg imidokarb'a eşdeğer 120 mg imidokarb dipropiyonat içerir.

KULLANIM SAHASI /ENDİKASYONLAR:

Sığır

Babesiosis (*Babesia argentina*, *B. bigemina*, *B. bovis* and *B. divergens*.) ve Anaplasmosis marginale tedavisi ve önlenmesi,

Köpek

Babesiosis (*Babesia canis*, *B. gibsoni* and *B. vogelli*.) tedavisi ve önlenmesi,

At

Babesiosis (*B. equi* ve *B. caballi*) tedavisi ve önlenmesinde kullanılır

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Sığır

Babesiosis: Derin kas içi (kalça veya boyun bölgesi) veya deri altı yolla uygulanır.

Korunma: Her kg vücut ağırlığı için 2.125 mg imidokarb (her 100 kg vücut ağırlığı için 2.5 ml)

Tedavi: Her kg vücut ağırlığı için 0.85 mg imidokarb (her 100 kg vücut ağırlığı için 1 ml)

Tek enjeksiyon uygulanır.

Anaplasmosis:

- Bovine anaplasmosis: Her kg vücut ağırlığı için 2.125 mg imidokarb (her 100 kg vücut ağırlığı için 2.5 ml)

Köpek

Babesiosis: Kas içi veya deri altı yolla uygulanır.

Korunma: Her kg vücut ağırlığı için 4.25 mg imidokarb (her 10 kg vücut ağırlığı için 0.5 ml).

Korunma 4-6 haftayı aşmaz.

İMİDOVİL

Veteriner Antiprotozooner

Enjeksiyonluk Çözelti



Tedavi: Her kg vücut ağırlığı için 2.125 mg imidokarb (her 10 kg vücut ağırlığı için 0.25 ml)
Tek enjeksiyon uygulanır.

At

Kas içi yolla uygulanır. B. caballi için normalde her 100 kg vücut ağırlığı için 2 ml olarak tek doz uygulama yeterlidir. Ancak B. equi için hastalığın klinik durumuna göre 24-72 saat aralıklarla iki uygulama gerekebilir. Tek doz uygulama azami 4 haftaya kadar koruyuculuk sağlar. B. caballi enfestasyonlarının sterilizasyonu için 24 saat arayla ve iki defa olmak üzere her 100 kg vücut ağırlığı için 2 ml uygulama, B. equi enfestasyonlarının sterilizasyonu için 72 saat arayla ve 4 defa olmak üzere her 100 kg vücut ağırlığı için 4 ml uygulama gereklidir. Atlarda dirençli olgularda takip eden sterilizasyon uygulamaları arasında en az 6 hafta olmalıdır.

LEVAMİN

Veteriner Anthelmintik

Oral Toz



BİLEŞİMİ: Levamin Oral toz, beyaz renkli, homojen toz olup 1 g'da 150 mg Levamizol Hidroklorür içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Levamin Oral Toz, anthelmintik etkinliğe sahip geniş etki spektrumlu bir müstahzardır. Sığır, koyun ve kanatlılarda iç parazitlerin mücadelesi ve kontrolünde kullanılır. Levamin Oral Toz, aşağıdaki parazitler ile mücadelede başarı ile kullanılır:

Sığırlarda: Gastrointestinal nematodlar: Ostertagia sp., Haemonchus sp., Trichostrongylus sp., Cooperia sp., Oesaphagostomum sp., Nematodirus sp., Stroglyoides sp., Bunostomum sp., Trichuris sp., Toxacara sp., Neoascaris sp. **Akciğer kılkırtları:** Dictyocaulus viviparus.

Koyun: Gastrointestinal nematodlar: Ostertagia sp., Haemonchus sp., Trichostrongylus sp., Cooperia sp., Oesaphagostomum sp., Nematodirus sp., Stroglyoides sp., Chabertia sp., Trichuris sp. **Akciğer kılkırtları:** Dictyocaulus filaria, Prostostroglylus rufescens. **Kanatlılarda:** Heterakis galinarium, Syngamus trachea, Oxyspirura mansoni, Capilaria spp., amidostomum spp., Ascaridia spp.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Sığır ve koyunlarda, Farmakolojik doz: 7,5 mg/kg canlı ağırlık dozda oral yolla uygulanır.

Kanatlılarda, Farmakolojik doz: 18-36 mg/kg canlı ağırlık dozda oral yolla uygulanır.

Pratik Doz Tablosu

Sığır - Koyun	1 g / 20 kg canlı ağırlık
Kanatlılarda	1 g / 5 kg canlı ağırlık

PARVAKUVİL

Veteriner Antiprotozooner

Enjeksiyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: PARVAKUVİL Enjeksiyonluk Çözelti, her 1 ml, 50 mg Buparvakuon içerir.

KULLANIM SAHASI /ENDİKASYONLAR: Sığırlarda Theileria annulata, T. parva, T. bovis, T. mutans, T. sergenti'den ileri gelen Theileriosis'in tüm formlarının tedavisinde kullanılır. Parvakuvil Enjeksiyonluk Çözeltinin etkin maddesi olan Buparvakuon'un etkisi Theileria'ya karşı spesifiktir. Bu kan parazitlerinin hem şizont hem de alyuvarlar içindeki devrelerine etkili olduğu için, Parvakuvil Enjeksiyonluk Çözelti, hastalığın kuluçka döneminde ve klinik belirtiler görüldükten sonra uygulanabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Parvakuvil Enjeksiyonluk Çözelti sığırlara sadece boyundan derin kas içi yolla aşağıdaki dozlara göre uygulanır.

Farmakolojik doz: 2,5 mg / kg canlı ağırlık olarak hesaplanır.

Pratik doz: Sığırlar için 1 ml / 20 kg canlı ağırlıktır.

Genellikle tek uygulama yeterlidir ancak ağır vakalarda aynı doz, 48 veya 72 saat sonra tekrar uygulama yapılabilir. Bir defada 10 ml'den daha fazla kullanılması gerektiğinde, toplam miktarın bölünerek iki ayrı yere enjekte edilmesi önerilir.

VILAZOL 1500

Veteriner Anthelmintik

Oral Tablet



BİLEŞİMİ: Vilazol 1500 Oral Tablet, beyaz-beyazımsı ve ortası çentikli olup her 1 tablet, 1500 mg Albendazol içerir.

KULLANIM SAHASI /ENDİKASYONLAR: Albendazol sığır, keçi ve koyunlarda gastrointestinal yuvarlak kurtlar, akciğer kurtları, şeritler ve erişkin karaciğer kelebeklerine etkili geniş spektrumlu bir anthelmintiktir. Aynı zamanda kelebek ve yuvarlak kurtlarda ovisidal etki gösterir, bu sayede çayır/mera kontaminasyonunun azaltılmasını sağlar.

Sığır

Yuvarlak kurt: Teladorsagia, Haemonchus, Trichostrongylus, Nematodirus, Oesophagostomum, Bunostomum, Cooperia ve Strongyloides spp. Genellikle Cooperia ve Ostertagia inhibe larvalarına da etkilidir.

Akciğer kurdu: Dictyocaulus viviparus,

Şerit: Moniezia spp.,

Erişkin karaciğer keleşi: Fasciola hepatica

Koyun-keçi

Aşğıdaki türlerin benzimidazollere duyarlı suşlarına karşı etkilidir.

Yuvarlak kurtlar: Teladorsagia, Haemonchus, Trichostrongylus, Cooperia curticei, Nematodirus, (N.battus dâhil), Chabertia, Bunostomum ve Oesophagostomum. Genellikle inhibe Ostertagia larvalarına da etkilidir.

Akciğer kurdu: Dictyocaulus filaria

Şerit: Moniezia spp.,

Erişkin karaciğer keleşi: Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceolatum (dentriticum)

VİLAZOL 1500

Veteriner Antihelmintik

Oral Tablet



KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Ağız yolu ile uygulanır. Tabletlerin hayvan tarafından yutulduğundan emin olunmalıdır.

Siğir

Yuvarlak kurt, akciğer kurdu, şeritler ile karaciğer keleşbeęi ve yuvarlak kurt yumurtaları için 7.5 mg albendazol/kg vücut ağırlığı dozunda uygulanır.

Erişkin karaciğer keleşbeęi için ise 10 mg albendazol/kg vücut ağırlığı dozunda uygulanır.

Koyun

Yuvarlak kurt, akciğer kurdu, şeritler ile karaciğer keleşbeęi ve yuvarlak kurt yumurtaları için 5 mg albendazol/kg vücut ağırlığı dozunda,

Erişkin karaciğer keleşbeęi (F. hepatica) için 7.5 mg albendazol/kg vücut ağırlığı dozunda,

Dicrocoelium lanceolatum (dentriticum) için 15 mg albendazol/kg vücut ağırlığı dozunda uygulanır.

Keçi

Yuvarlak kurt, akciğer kurdu, şeritler ile Erişkin karaciğer keleşbeęi (F. hepatica) için 7,5 mg albendazol/kg vücut ağırlığı dozunda,

Dicrocoelium lanceolatum (dentriticum) için 15 mg albendazol/kg vücut ağırlığı dozunda uygulanır.

VİLMECTİN

Veteriner Endektosit

Enjeksiyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: Vilmectin Enjeksiyonluk Çözelti, renksiz, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk çözelti olup, 1 ml'de 10 mg. ivermektin içerir.

KULLANIM SAHASI /ENDİKASYONLAR: Vilmectin Enjeksiyonluk Çözelti, endo ve ektoparaziter etkinliğe sahip geniş etki spektrumlu bir müstahzardır. Sığır ve koyunlarda iç ve dış parazitlerinin mücadelesi ve kontrolünde kullanılır. Vilmectin Enjeksiyonluk Çözelti, aşağıdaki parazitler ile mücadelede başarı ile kullanılır:

Sığırlarda

Gastro-intestinal Nematodlar: Heamonchus placei, Ostertagia sp., O.ostertagi (erginler, larval devreler, hipobiotik larvalar), O.lyrate (erginler, L4 larvalar), Mecistocirrus digitatus (erginler), Trichostrongylus axei, T.colubriformis, Cooperia oncophora, C.punctata, C.pectinata, Cooperia sp., Nematodirus helvetianus (erginler), N.spathiger (erginler), Oesophagostomum radiatum, Strongyloides papillosus (erginler), Bunostomum phlebotomum, Toxacara vitulorum.

Akciğer Kıl Kurtları: Dictyocaulus viviparus

Deride Filariosis Etkenleri: Parailaria bovicola

Göz Nematodları: Thelezia sp. (ergin)

Nokra etkeni sinek larvaları: Hypoderma bovis (larva), Hypoderma lineatum (larva), Dermatobia hominis (larva)

Yara Kurtları (parazitik dönemde): Chrysomya bezziana, Cochliomya hominivorax

Uyuz Etkenleri: Psoroptes communis bovis, Psoroptes communis ovis, Sarcoptes scabiei bovis, Chorioptes bovis

Bitler: Linognathus vituli, Haematophinus eurysternus, Solenopotes capillatus, Damalinia bovis

Keneler (bazı tek konaklı keneler, yumuşak keneler): Boophylus sp., Ornithodorus savignyi

VİLMECTİN

Veteriner Endektosit

Enjeksiyonluk Çözelti



Koyunlarda

Gastro-intestinal Nematodlar: eamonchus sp., Ostertagia sp., Trichostrongylus sp., Cooperia sp., Nematodirus sp., Oesophagostomun sp., Strongyloides papillosus, Chabertia ovina, Trichuris ovis

Akciğer Kıl Kurtları: Dictyocaulus ilaria

Uyuz Etkenleri: Sarcoptes scabiei var. Ovis, Psoroptes ovis, Chorioptes bovis var. ovis

Bitler: Bovicola ovis, Linognatus pedalis, L.ovillus, L.stenopsis

Koyun Yapağı Sineği: Melophaga ovinus

Burun Kurtları: Oestrus ovis

Yara Kurtları: Chrysomia bezziani

Keneler (Tek konaklı): Boophilus sp., Ornithodorus lahorensis

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Vilmectin Enjeksiyonluk Çözelti, sadece deri altı yolla uygulanır. Sığırlarda boyun bölgesinde veya scapula gerisinde gevşek deri altına, koyunlarda koltuk altı veya koltuk arkasında derinin gevşek bölgesinde deri altı yolla enjekte edilir. Uygulama yapılırken asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalı, kuru, steril iğne ve şırınga kullanılmalıdır. Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Sığır ve koyunlarda: 0.2 mg /kg canlı ağırlık hesabıyla, 50 kg canlı ağırlık için 1 ml deri altı yolla uygulanır.

KOYUN	
Canlı Ağırlık	Doz
20-25	0.5
25-30	0.6
30-35	0.7
35-40	0.8
40-50	1.0

SIĞIR	
Canlı Ağırlık	Doz
50	1.0
75	1.5
100	2.0
150	2.0
200	4.0
300	6.0
400	8.0
500	10.0
600	12.0

VİLMECTİN FCL

Veteriner Endektosit ve Fasiolosid



Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ: VİLMECTİN Fcl Enjeksiyonluk Çözelti, renksiz veya hafif sarı renkli, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk çözelti olup, 1 ml'de 10 mg İvermektin ile 100 mg Klorsulon içerir.

KULLANIM SAHASI /ENDİKASYONLAR: Vilmectin Fcl Enjeksiyonluk Çözelti, endo ve ektoparaziter etkinliğe sahip geniş etki spektrumlu bir müstahzardır. Sığırlarda iç ve dış parazitlerle mücadelede başarı ile kullanılır. Vilmectin Enjeksiyonluk Çözelti, aşağıdaki parazitler ile mücadelede başarı ile kullanılır:

Sığırlarda

Karaciğer Kelebekleri: Fasciola hepatica (ergin), Fasciola gigantica (ergin)

Gastro-intestinal Nematodlar: Haemonchus placei, Ostertagia sp., O.ostertagi (erginler, larval devreler, hipobiotik larvalar), O.lyrate (erginler, L4 larvalar), Mecistocirrus digitatus (erginler), Trichostrongylus axei, T.colubriformis, Cooperia oncophora, C.punctata, C.pectinata, Cooperia sp., Nematodirus helvetianus (erginler), N.spathiger (erginler), Oesophagostomum radiatum, Strongylus papillosus (erginler), Bunostomum phlebotomum, Toxacara vitulorum.

Akciğer Kıl Kurtları: Dictyocaulus viviparus

Deride Filariosis Etkenleri: Parailaria bovicola

Göz Nematodları: Thelezia sp. (erginleri)

Nokra etkeni sinek larvaları: Hypoderma bovis (larva), Hypoderma lineatum (larva), Dermatobia hominis (larva)

Yara Kurtları (parazitik dönemde): Chrysomya bezziana, Cochliomya hominivorax

Uyuz Etkenleri: Psoroptes communis bovis, Psoroptes communis ovis, Sarcoptes scabiei bovis, Chorioptes bovis

Bitler: Linognathus vituli, Haematophinus eurysternus, Solenopotes capillatus, Damalinia bovis

Keneler (bazı tek konaklı keneler, yumuşak keneler): Boophilus microplus, Boophilus decoloratus, Ornithodorus savignyi

VİLMECTİN FCL

Veteriner Endektosit ve Fasiolosid



Enjeksiyonluk Çözelti

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Vilmeectin Fcl Enjeksiyonluk Çözelti, sadece deri altı yolla uygulanır. Sığırlarda boyun bölgesinde veya scapula gerisinde gevşek deri altına enjekte edilir. Uygulama yapılırken asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalı, kuru, steril iğne ve şırınga kullanılmalıdır. Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Sığırlarda: 0.2 mg ivermektin ve 2 mg klorsulon/kg canlı ağırlık hesabıyla, 50 kg canlı ağırlık için 1 ml deri altı yolla uygulanır. **Pratik doz tablosu:**

SİĞİR	
(Kg) CA	Doz (ml)
50	1.0
100	2.0
150	2.0
200	4.0
300	6.0
400	8.0
500	10.0
600	12.0

10 ml'yi aşan dozlarda doz ikiye bölünerek uygulanmalıdır. Sadece deri altı yolla uygulanır. Kas içi veya damar içi yolla uygulanmaz. İlk defa meraya çıkan genç hayvanlara, meraya çıkışı takip eden 3 üncü, 8 inci ve 13 üncü haftalarda olmak üzere 3 uygulama yapıldığında o yılın mera mevsiminde en iyi sonuçlar alınabilir. Koyunlarda psoroptik uyuz tedavisinde en iyi sonuçları alabilmek için 7 gün ara ile 2 defa uygulama yapılması tavsiye olunur.

OKSAVET

Veteriner Antihelmintik

Oral Tablet



BİLEŞİMİ: Oksavet Oral Tablet, beyaz-krem renkli, ortası çentikli tablet olup, 1 tablet 'de 300 mg oksfendazol, 600 mg oksiklozanid içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Sığır ve koyunlarda; mide-bağırsak ve akciğer kurtlarının olgun ve genç şekilleri ile karaciğer kelekleri ve Moniezia sp. erginlerine karşı tedavi ve korunma amaçlı kullanılır. Oksavet Oral Tablet, aşağıdaki parazitler ile mücadelede başarı ile kullanılır:

Sığırlarda

Karaciğer kelekleri: Fasciola hepatica, F.gigantica (ergin)

Gastro-intestinal nematodlar: Ostertagia sp., Haemonchus sp., Trichostrongylus sp., Cooperia sp., Oesophagostomum sp., Nematodirus sp., Strongyloides sp., Bunostomum sp., Trichuris sp.

Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus viviparus. **Şeritler:** Moniezia sp.

Koyunlarda

Karaciğer kelekleri: Fasciola hepatica, F.gigantica.

Gastro-intestinal nematodlar: Ostertagia spp., Haemonchus sp., Trichostrongylus sp., Cooperia sp., Oesophagostomum sp., Nematodirus sp., Strongyloides sp., Chabertia sp., Trichuris sp.

Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus filaria. **Şeritler:** Moniezia sp.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde,

Farmakolojik doz: Oksiklozanid 15-20 mg/kg, Okfendazol 5-7,5 mg/kg canlı ağırlık dozda oral yolla kullanılır.

Pratik doz: 1 tablet/40 kg canlı ağırlık

Kuzu 1/2 tablet Koyun 1 tablet Dana 3-4 tablet Sığır 5 tablet

OKSAVİL

Veteriner Antihelmintik

Oral Tablet



BİLEŞİMİ: Oksavil Oral Tablet, beyaz-krem renkli, ortası çentikli tablet olup, 1 tablette 375 mg oksfendazol, 750 mg oksiklozanid içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Oksavil Oral Tablet, sığır ve koyunlarda mide-bağırsak ve akciğer kıl kurtlarının olgun ve genç şekilleri ile karaciğer kelekleri ve Moniezia sp. erginlerine karşı tedavi ve korunmasında antihelmintik olarak kullanılır.

Oksavil Oral Tablet, aşağıdaki parazitler ile mücadelede başarı ile kullanılır:

Sığırlarda

Karaciğer kelekleri: Fasciola hepatica, F. gigantica (ergin)

Gastro-intestinal nematodlar: Ostertagia sp., Haemonchus sp., Trichostrongylus sp., Cooperia sp., Oesophagostomum sp., Nematodirus sp., Strongyloides sp., Bunostomum sp., Trichuris sp.

Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus viviparus (ergin ve larva)

Şeritler: Moniezia sp.

Koyunlarda

Karaciğer kelekleri: Fasciola hepatica, F. gigantica (ergin)

Gastro-intestinal nematodlar: Ostertagia sp., Haemonchus sp., Trichostrongylus sp., Cooperia sp., Oesophagostomum sp., Nematodirus sp., Strongyloides sp., Chabertia sp., Trichuris sp.

Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus filaria (ergin ve larva)

Şeritler: Moniezia sp.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde,

Farmakolojik doz: Oksiklozanid sığırlara 10-15 mg/kg canlı ağırlık, koyunlara 10-20 mg/kg canlı ağırlık ve Oksfendazol sığırlara 4,5-5 mg/kg canlı ağırlık ve koyunlara 5-7,5 mg/kg canlı ağırlık dozda oral yolla kullanılır.

OKSAVİL

Veteriner Anthelmintik

Oral Tablet



Pratik Doz: 1 tablet/50 kg canlı ağırlık

Hayvan Türü	Canlı Ağırlık	Doz
Kuzu	25 kg'a kadar	1 / 2 tablet
Koyun	50 kg'a kadar	1 tablet
Dana	150 - 250 kg	2 / 3 tablet
Siğir	251 - 400 kg	4 / 6 tablet

Oksavil Oral Tablet hayvanlara doğrudan yutturularak veya su içinde eriterek içirilmek suretiyle verilir. Tabletler gerektiğinde ortasındaki çentik kısmından bölünerek kullanılabilir.

Vitaminler, Mineraller ve Yem Katkıları

Sayfa

ÜRÜNLER

71

Adevil

72

Beforvel

73

E-Sevil

74

Fosfovet

75

Katovil

ADEVİL

Veteriner Vitamin

Enjeksiyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: Adevil Enjeksiyonluk Çözelti, sarı renkli, berrak, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk çözelti olup, her 1 ml'de 200.000 IU Vitamin A propiyonat, 30.000 IU Vitamin D3, 20 mg Vitamin E asetat bulunur.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Adevil Enjeksiyonluk Çözelti, sığır, at, koyun ve keçilerde A, D3 ve E vitaminlerinin noksanlıklarının giderilmesinde ve bu noksanlıklara bağlı hastalıkların sağaltımında; yemlerdeki vitamin noksanlıklarından kaynaklanan genç hayvanlarda raşitizm, erginlerde osteomalasi gibi hastalıkların sağaltımında, artan A, D3 ve E vitamin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, Sığır ve atlarda kas içi, diğer hayvanlarda deri altı yol ile uygulanır.

Pratik doz tablosu:

Sığır, At	7 ml
Dana, Tay	3-5 ml
Buzağı	3 ml
Koyun, Keçi	2 ml
Kuzu, Oğlak	0.5 - 1 ml

BEFORVEL

Veteriner Vitamin

Enjeksiyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: Beforvel Enjeksiyonluk Çözelti, sarı renkli, berrak, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk çözelti olup, 1 ml' de 5 mg Vitamin B1, 2 mg Vitamin B2, 2 mg Vitamin B6, 4 µg Vitamin B12, 20 mg Niasinamid, 10 mg D-pantenol içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Beforvel Enjeksiyonluk Çözelti, sindirim sistemi hastalıklarına bağlı olarak şekillenen absorbsiyon bozukları, ateşli, akut ve kronik enfeksiyonlarda asıl tedavinin yanında destekleyici olarak ve buna bağlı nekahat dönemleri, oral antibiyotik ve sülfonamid uygulamaları, mineral eksikliğine bağlı beyaz kas ve enzootik ataksi gibi hastalıklar, deri, kas, sinir sistemi hastalıkları, genç hayvanların gebelikleri ve yeni doğanların sepsisemi, pnömoni ve ishalleri, anemi, stres durumları, verim düşüklüğü ve fiziki güçsüzlük hallerinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, Sığır ve atlarda kas içi, diğer hayvanlarda deri altı yol ile uygulanır.

Pratik doz tablosu:

Sığır, At	15-30 ml
Dana, Düve	10-15 ml
Buzağı, Tay	5-10 ml
Koyun, Keçi	5-10 ml
Köpek	1-5 ml
Kedi	1 ml

E-SEVİL

Veteriner Vitamin Mineral

Enjeksiyonluk Emülsiyon



BİLEŞİMİ: E-sevil Enjeksiyonluk Emülsiyon, beyaz renkli, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk emülsiyon olup, 1 ml'de 1 mg Sodyum selenit, 60 mg Vitamin E, 40 mg Vitamin B1 içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: E-sevil Enjeksiyonluk Emülsiyon, genç hayvanlarda özellikle buzağlarda besinsel kas distrofisi diye bilinen beyaz kas hastalığında, selenyum ve vitamin E'den yoksun rasyonla beslenen gebe hayvanların doğuracağı yavruların yetmezlik sendromlarının önlenmesinde, kaslarda beslenme yetersizliği sonucu gelişen zafiyet ve atrofi durumlarında, konvülsiyon, paralysis, nakil stresleri, yeme isteğinin azalması, karaciğer nekrozisi, formülasyonda bulunan etkin maddelerin eksikliği ya da yokluğundan kaynaklanan infertilite durumlarında, genç hayvanların gelişim bozukluğu durumlarında kullanılır. Atlarda: Myoglobinüri ve miyosit'de.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, E-sevil Enjeksiyonluk Emülsiyon, gebe inek, at, koyun, keçi ile kuzu, oğlak, buzağı, tay, kedi, köpeklerde kullanılır. Deri altı ve kas içi yolla uygulanır.

Pratik doz tablosu:

Hayvan Türü	Koruyucu	Sağaltıcı
İnek, At (Gebeliğin 5. ayından sonra)	5-10 ml	----
Koyun, Keçi (Gebeliğin 3. ayından sonra)	1-2 ml	----
Buzağı, Tay	0,5-1 ml	1-2 ml
Kuzu, Oğlak (1-7 günlük)	0,25 ml	0,25-0,5 ml
Kuzu, Oğlak (7-30 günlük)	0,25-0,5 m	0,5-1 ml
Kuzu, Oğlak (1 aydan büyük)	0,5-1,0 ml	1-2 ml
Kedi, Köpek	----	0,1-1,0 ml

Gerektiği takdirde 1 hafta sonra doz tekrarlanır. Uygulama öncesi şişe çalkalanmalıdır. Devamlı tedavide 2 hafta ara ile en çok 4 doz uygulanabilir.

FOSFOVET

Veteriner Mineral

Enjeksiyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: Fosfovet Enjeksiyonluk Çözelti, renksiz, berrak, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk çözelti olup, 1 ml'de 200 mg. Toldimfos sodyum (sodium-4- dimethylamino - 2- methyl - phenyl - phosphate) içerir. Etken maddenin organik olarak bağlanmış fosfor içeriği %14'dür.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Sığır, koyun, keçi, at, kedi, köpeklerde fosfor eksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Ven içi, kas içi veya deri altı yolla uygulanır. Uygulama dozu fosfor ihtiyacı ve hayvanın durumuna göre hekim tarafından belirlenmelidir. Tavsiye dozları şu şekildedir: **Sığır, koyun, keçi ve atlarda** 10 mg/kg (pratik olarak her 20 kg canlı ağırlık için 1 ml), **Kedi ve köpeklerde** 20 mg/kg dozunda (pratik olarak her 5 kg için 0.5 ml) uygulanır. Üçer gün ara ile 3-5 uygulama genel olarak yeterlidir. Acil durumlarda dozun yarısı ven içi kalan miktarı da kas içi veya deri altı uygulanabilir. Kronik eksikliklerde 48 saat arayla 5-10 uygulama (kas içi veya deri altı) uygulanabilir.

KATOVİL

Veteriner Mineral Vitamin

Enjeksiyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: KATOVİL Enjeksiyonluk Çözelti, kırmızımsı renkli berrak çözelti olup, 1 ml'sinde 100 mg Butafosfan (17,30 mg fosfora denk gelmektedir) ve 0,05 mg Vitamin B12 içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Sığır, at, kedi, köpeklerde Fosfor ve siyanokobalamin kullanımının gerekli olduğu kas, metabolizma veya üreme sistemi bozukluklarında destekleyici olarak,

Sığırlarda ikincil ketozisle ilişkili abomasum deplasmanının cerrahi tedavisi sonrası ruminasyon faaliyetlerinin iyileşmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

Doğum öncesi dönemde oluşan metabolik bozukluklar, tetani ve parezis (süt humması) durumlarında magnezyum ve kalsiyuma ilave olarak kullanılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Aşağıda verilen dozlar tavsiye dozudur. Doz ve uygulama aralıkları hayvanların durum ve ihtiyacına göre değişebilmekte olup, hekimin kararına bağlıdır.

Sığır

Ven içi olarak uygulanır.

Fosfor ve/veya Vitamin B12 eksikliği tedavisinde;

Erişkin sığırlarda her kg vücut ağırlığına 2-5 mg butafosfan ve 0.001-0.0025 mg siyanokobalamin (pratik olarak her 100 kg vücut ağırlığına 2-5 ml) uygulanır.

Buzağılarda her kg vücut ağırlığına 10-25 mg butafosfan ve 0.005-0.0125 mg siyanokobalamin (pratik olarak her 100 kg vücut ağırlığına 10-25 ml) uygulanır.

Gerekli durumlarda enjeksiyonlar günlük tekrarlanır.

KATOVİL

Veteriner Mineral Vitamin

Enjeksiyonluk Çözelti



İkincil ketozisle ilişkili abomasum deplasmanının cerrahi tedavisi sonrası ruminasyon faaliyetlerinin iyileşmesine yardımcı olmak amacıyla;

100 kg vücut ağırlığı için 5 ml, üç gün ve günde bir enjeksiyon uygulanır. İlk uygulama operasyon günü yapılmalıdır.

Atlar

Ven içi uygulanır.

Erişkin atlarda her kg vücut ağırlığına 2-5 mg butafosfan ve 0.001-0.0025 mg siyanokobalamin (pratik olarak her 100 kg vücut ağırlığına 2-5 ml) uygulanır.

Taylarda pratik olarak her 10 kg vücut ağırlığına 0.35-0.6 ml uygulanır.

Kedi ve köpeklerde

Ven içi, kas içi, deri altı uygulanır.

Köpeklerde her kg vücut ağırlığına 2,5-25 mg butafosfan ve 1.0-2,5 mg siyanokobalamin (pratik olarak her 10 kg vücut ağırlığına 0,25-2,5 ml) uygulanır.

Kedilerde her kg vücut ağırlığına 10-50 mg butafosfan ve 5-25 mg siyanokobalamin (pratik olarak her 5 kg vücut ağırlığına 0,5-5 ml) uygulanır.

Kronik durumlarda verilen dozların yarısı uygulanır, diğer yarısı 1-2 hafta sonra uygulanır.

Klinik Ürünler

Sayfa

ÜRÜNLER

78	Atrovil
79	Fluvil
80	Kafevil
81	Timpasol
82	Vilanov
83	Vilcain
84	Vilprofen

ATROVİL

Veteriner Antikolinerjik

Enjeksiyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: ATROVİL Enjeksiyonluk Çözelti, renksiz veya açık sarı renkli berrak çözelti olup, 1 ml'sinde 2 mg atropin sülfat içerir.

KULLANIM SAHASI /ENDİKASYONLAR:

At, kedi, köpeklerde Antikolinesteraz etkili zehirlenmelerde (fosforik esterler, karbamatlar, organik klorlular gibi) parsiyal antidot olarak

Genel anestezide bradikardiye ve bronşial sekresyonu önlemek amacıyla pre-anestezik olarak, Düz kaslardaki (sindirim sistem, üriner sistem, uterus, bronşlar, safra kanalı gibi düz kaslarda spazmolitik olarak,

Atriyoventiküler blok veya sinüs bradikardi durumlarında kardiyak uyarıcı olarak, Bronşial sekresyonu azaltıcı ve solunum uyarıcı olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Hekimin seçimine bağlı olmakla birlikte genel olarak 25-500 µg/kg canlı ağırlık dozunda uygulanır. Alt dozlar daha çok parasempatolitik etki ve preanestezik amaçla, üst dozlar ise antikolinesteraz etkili zehirlenmelerde kullanılır. Atrio-ventiküler blok veya sinüs bradikardi durumlarında düzelme sağlanana kadar 6-8 saatte bir uygulama yapılabilir.

Antikolinesteraz etkili zehirlenmelerde aşağıdaki şekilde kullanılır;

Ciddi vakalar: Gerekli dozun bir kısmı (çeyreği) kas içi veya yavaş damar içi yolla kalan kısmı deri altı yolla uygulanır.

Daha az ciddi vakalar: Tüm doz deri altı yolla uygulanır.

Zehirlenmenin şiddetine göre tekrarlayan dozlar gerekebilir. Uygulama aralığı genel olarak 3-4 saat olmakla birlikte ciddi veya orta şiddetli belirtilerin tekrarlama aralığına bağlıdır.

Atropin uygulamadan dakikalar sonra etkisini gösterir ve bu azami etki uygulamadan sonra 5-10 dakikaya kadar gecikebilir.

FLUVİL

Veteriner Non-steroid Antienflamatuar

Enjeksiyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: Fluvil Enjeksiyonluk Çözelti, renksiz, berrak, kullanma hazır, steril enjeksiyonluk çözelti olup, 1 ml'de 50 mg Fluniksine eşdeğer Fluniksine meglumin içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:

At

Muskuloskeletal ağrı ve enflamasyonun ve kolik ağrılarının azaltılması

Sığır

Uygun antienfektif tedavi ile birlikte solunum sistemi enfeksiyonları süresince oluşan klinik belirtilerin azaltılması için kullanılır

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Ven içi yol ile uygulama yavaş yapılmalı, ürün ven içi verilmeden önce vücut ısısına çıkarılmalıdır. Hızlı ven içi enjeksiyonlar tehlikelidir. Diğer bölümleri okuyunuz. Arter (atardamar) içine uygulanmaz.

At

Muskuloskeletal rahatsızlıklarda ağrının ve yangının hafifletilmesi amacıyla; 1 mg/kg vücut ağırlığı/gün dozunda (her 50 kg vücut ağırlığı için 1 ml) ven içi olarak 1-5 gün uygulanır. Kolik ağrılarının azaltılması amacıyla; 1 mg/kg vücut ağırlığı/gün dozunda (her 50 kg vücut ağırlığı için 1 ml) ven içi olarak uygulanır. Kolik tekrar ettikçe 1-2 defa tekrarlanabilir.

Sığır

2 mg/kg vücut ağırlığı/gün (her 50 kg vücut ağırlığı için 2 ml), ven içi veya kas içi yolla 1-3 gün uygulanır. 20 ml'den büyük dozlar en az iki farklı bölgeye uygulanmalıdır.

KAFEVİL

Veteriner Analeptik

Enjeksiyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: KAFEVİL Enjeksiyonluk Çözelti, renksiz veya açık sarı renkli berrak çözelti olup, 1 ml'sinde 250 mg kafein içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: KAFEVİL Enjeksiyonluk Çözelti, merkezi sinir sisteminin ve özellikle de solunum merkezinin uyarılması gereken bütün durumlarda uyarıcı olarak kullanılır. Ateşli hastalıklarda (pnömoni, şap v.s.) kalbin mutlak potansiyelini arttırıcı olarak, solunum sistemi uyarmada, özellikle kalp hastalıklarında portal ve renal sebeplere bağlı ascites'de, diüretik olarak (dijital ile birlikte), çizgili kasların faaliyetini arttırmada, doğum felçlerinde, narkoz zehirlenmelerinde, arekolin ve benzeri ilaçların kullanılmasından önce kalbi takviye etmek için kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; KAFEVİL Enjeksiyonluk Çözelti, deri altı yolla tek doz olarak uygulanır.

Farmakolojik doz: 5-15 mg /kg canlı ağırlıktır.

Pratik doz:

At ve sığır : 2-6 ml/100 kg canlı ağırlık

Koyun ve keçi : 1-3 ml/50 kg canlı ağırlık

Köpek ve kedi : 0,1-0,3 ml/5 kg canlı ağırlık olarak uygulanır.

TİMPASOL

Veteriner Gaz Giderici

Oral Çözelti



BİLEŞİMİ: Timpasol Oral Çözelti, renksiz, berrak, kokusuz ve yağlı oral çözelti olup, 1 ml'de minimum %99 Asetil- tribütilsitrat içerir.

KULLANIM SAHASI /ENDİKASYONLAR: Timpasol Oral Çözelti, sığır, koyun ve keçilerde görülen gazlı ve gazsız timpanilerin sağaltımında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, Timpasol Oral Çözelti, sığır, koyun ve keçilerde görülen timpanilerde oral ya da rumen içi yolla aşağıda ki dozlarda uygulanmalıdır.

Sığır : 20-30 ml,

Koyun ve keçiler : 5 -10 ml dozunda kullanılır.

Timpasol Oral Çözelti, kullanmadan önce bir miktar su ile karıştırılması uygulamayı kolaylaştıracaktır. Veteriner hekim gerekli gördüğünde uygulama 6 - 10 saat sonra tekrarlanır. Uygulama sonucunda Rumen ve retikulumda biriken gazın geçirme yolu ile atılması beklenir. Ancak geçirme mekanizmasında herhangi bir aksaklık söz konusu ise, birikmiş olan gazın bir sonda yardımı ile çıkarılması gerekli olacaktır.

VİLANOV

Veteriner Non-Steroidal Antienflamatuvar

Enjeksiyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: VİLANOV Enjeksiyonluk Çözelti, karakteristik kokulu, renksiz, berrak, steril çözelti olup 1ml'de 500 mg metamizol sodyum (phenyl-dimethyl pyrazolone-methylamino methane sulfonate sodium salt) içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:

Sığır, at, köpeklerde merkezi aneljezik, spazmolitik, antipiretik veya orta dereceli antienflamatuvar etkinin istendiği durumlarda kullanılır. Örneğin:

- Arthritis, myositis, rheumatism gibi muskuloskeletal sistemin akut ağrılı yangıların tedavisi,
- Genel ağrılı durumların tedavisi,
- Antispazmodik olarak uterus veya diğer iç organ spazmları ve at koliği tedavisi,
- Yemek borusunda yabancı cisim tıkanmalarında spazmın tedavisinde kullanılır

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Atlarda YAVAŞ VEN İÇİ, diğer hayvanlarda derin kas içi veya şiddetli ağrılı hallerde YAVAŞ VEN İÇİ kullanılır. Tedavi 24 saat sonra tekrarlanabilir.

At ve sığır	: 20-50 mg metamizol/vücut ağırlığı dozunda (4-10 ml ürün/100 kg)
Tay-buzağı	: 25-75 mg metamizol/vücut ağırlığı dozunda (2-6 ml ürün/40 kg)
Köpek	: 25-50 mg metamizol/vücut ağırlığı dozunda (0,5-1 ml ürün/10 kg)

Uygulamanın uzun süre tekrarı halinde, uzun etkili metabolitlerin birikimi nedeniyle, dozaj azaltılmalıdır.

VILCAİN

Veteriner Lokal Anestezik

Enjeksiyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: Vilcain Enjeksiyonluk Çözelti, renksiz, berrak, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk çözelti olup, 1 ml'de 20 mg. Lidokain HCl ile 0,01 mg. Adrenalin içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: At, kedi ve köpeklerde, güç doğum, sezaryan, prolapsus uteri gibi jinekolojik müdahaleler ile kastrasyon, kuyruk amputasyonu gibi operasyonlardan önce ve travma sonrası lokal anestezi sağlamak, bunun yanında infiltrasyon, sinir uzamı anestezisi, epidural ve bölgesel anestezi amacıyla kullanılır. Ayrıca ağız, burun ve boğaz bölgesi mukoz membranlarının yüzeysel anestezileri için de uygun bir anesteziktir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, kullanım amacına göre; deri altı, sinir uzamı ve epidural yolla uygulanır.

Deri Altı

At 20-50 ml (azami doz: 150-200 ml)

Kedi, Köpek 2-5 ml (azami doz: kedide 5 ml, köpekte 30 ml)

Sinir uzamı anestezisi

At 2-15 ml azami doz: 30 ml)

Alt ve üst epidural Anestezide

20-50 ml (azami doz: 150-200 ml)

At 5-20 ml

Kedi, Köpek 1-5 ml

Kullanım sırasında asepsi ve antisepsiyeye dikkat edilmelidir.

VİLPROFEN

Veteriner Non-steroid
Antienflamatuvar ve Antiromatizmal

Enjeksiyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: VİLPROFEN Enjeksiyonluk Çözelti, renksiz veya açık sarı renkli berrak çözelti olup, 1 ml'sinde 100 mg ketoprofen içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:

Sığır

Doğuma bağlı doğum felcinin destekleyici tedavisi,

Uygun etiyolojik tedavi ile birlikte, bakteriyel solunum sistemi enfeksiyonlarında ağrı ve ateşi hafifletme,

Uygun etiyolojik tedavi ile birlikte, Gram-negatif bakteriler tarafından meydana getirilen akut endotoksik mastitis de dahil, akut klinik mastitte iyileşmenin desteklenmesi

Doğuma bağlı meme ödeminin hafifletilmesi,

Osteoartikular ve muskulo-skeletal sistem ağrıları,

Doğum sonrası ayağa kalkmanın kolaylaştırılması

At

Akut ağrı ve enflamasyon ile ilgili osteoartiküler ve kas-iskelet sistemini etkileyen hastalıklar:

- Travmatik orijinli topallık
- Artritis
- Osteitis, diz şişliği
- Tendinitis, bursitis
- Navikülitis
- Laminitis
- Myositis

Ayrıca ameliyat sonrası enflamasyon, kolik ve ateşin semptomatik tedavisinde kullanılır

VİLPROFEN

Veteriner Non-steroid
Antienflamatuvar ve Antiromatizmal

Enjeksiyonluk Çözelti



KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Sığır

Kas içi veya damar içi yolla 3 mg/kg canlı ağırlık/gün (pratik olarak her 100 kg canlı ağırlık için günde 3 ml) dozunda 3 güne kadar uygulanır.

At

Damar içi yolla 2.2 mg/kg canlı ağırlık/gün (pratik olarak her 45 kg canlı ağırlık için günde 1 ml) dozunda 3 -5 gün uygulanır. Kolik durumlarında klinik olarak gerekli ve uygun olduğu doğrulanmadıkça tekrarlanmamalıdır.

Kas içi uygulamalarda bir bölgeye 5 ml'den fazla uygulanmamalıdır.

Post-operatif ağrının azaltılmasında müdahaleden 10-30 dk önce uygulanmalıdır.

Doz aşımından kaçınmak için uygun enjektör kullanılmalı ve vücut ağırlığı tam hesaplanmalıdır.

Perfüzyonluk Çözeltiiler

Sayfa

ÜRÜNLER

87

Bikarvil

88

Cal-vet

89

Kalsimin

BİKARVİL

Veteriner Elektrolit

Perfüzyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: Bikarvil Perfüzyonluk Çözelti, renksiz, berrak, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk çözelti olup, 1 ml'de 84 mg (1 mEq/ml) sodyum bikarbonat içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Bikarvil Perfüzyonluk Çözelti, sığır, at, koyun, keçi ve köpeklerde birçok sebepten ileri gelen metabolik asidozun sağaltımında kullanılır. Özellikle, karbondioksit tutulmasından ileri gelen respiratorik asidozda; metabolik bozukluklara ilgili, asit metabolitlerin birikmesinden ileri gelen metabolik asidozda; böbrekler tarafından hidrojen iyonlarının yetersiz atılımı ile ilgili renal asidozda kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, Bikarvil Perfüzyonluk Çözelti, intravenöz ve yavaş olarak uygulanmalıdır. Çözeltinin konsantrasyonu hastanın durumuna ve gereksinmelerine göre belirlenir ve konsantrasyonlar dilüe edilmeden (% 8.4) veya izotonik (%1.5) olarak kullanılabilir. 4-8 saatlik bir periyod için uygulanacak sodyum bikarbonat miktarı; asidozun ciddiyeti, total karbondioksit miktarı, kan pH'sı ve hayvanın klinik durumuna göre ayarlanarak yaklaşık 2-5 mEq/kg (veya 2-5 ml/kg) canlı ağırlık olarak uygulanır. Plazma karbondioksit miktarı bilinmiyorsa ortalama bir doz olarak 2 ml/kg canlı ağırlık olarak Bikarvil Enjeksiyonluk Çözelti, % 5'lik dekstroz, izotonik tuzlu su veya uygun bir çözelti içinde uygulanabilir. Sağaltıma dilüsyon oranı izotonik (%1.5) olacak şekilde devam edilir. Sağaltımın tamamlanması hayvanın klinik durumuna bağlıdır. Ciddi semptomlar azalırsa uygulama sıklığı ve dozun miktarı azaltılmalıdır.

CAL-VET

Veteriner Mineral

Perfüzyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: Cal-vet Perfüzyonluk Çözelti, açık sarı renkli, berrak, kullanıma hazır, steril perfüzyonluk çözelti olup, 100 ml'de 20 g Kalsiyum glukonat, 4,5 g Kalsiyum glukheptonat, 0,5 g Kalsiyum D-sakkarat, 3,4 g Magnezyum klorür, 4,1 g Borik asit içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Hipokalsemik felç olaylarında, başta sığırlar olmak üzere bütün evcil hayvanlarda kalsiyum eksikliklerine karşı koruyucu olarak, doğum humması, laktasyon tetanisi, çayır ve hipomagnezemik tetani, seyahat ve çayır tetanileri olarak tanınan hastalıklarda, raşitizm ve osteomalasi, genç hayvanlarda görülen büyümenin yavaşlaması veya durması, üreme performansının azalması; alerjiler, zehirlenmeler, sinirsel kökenli bozukluklar (morbus maculozus, serum hastalığı, eklemisi'ler, anafilaksiler, eksantemler, hemorajik diyetezler, hematuri olayları ve alerjik olayların yatıştırılmasında.); kloroform, karbontetraklorür, organik fosforlu insektisitler başta olmak üzere cıva, kurşun, bakır, kalay, kadmiyum gibi metallerle meydana gelen zehirlenmeler, besinsel zehirlenmeler ve hayvan sokmalarında, yüksek miktarda fosfor ve fosfat alımını gerektiren durumlarda kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, **Doz Tablosu**

Hayvan Türü	Pratik Doz	Farmakolojik Doz
Sığır	(250-500 kg canlı ağırlık)	250-500 ml
At	(250-500 kg canlı ağırlık)	100-250 ml
Koyun, Keçi	(25-50 kg canlı ağırlık)	50-150 ml
Köpek	(3-25 kg canlı ağırlık)	3-25 ml

Damar içi, adale içi ve deri altı yolla uygulanır.

KALSİMİN

Veteriner Mineral

Perfüzyonluk Çözelti



BİLEŞİMİ: Kalsimin Perfüzyonluk Çözelti, renksiz, çok açık saman sarısı renkte, berrak, kullanıma hazır, steril perfüzyonluk çözelti olup, 100 ml'de 45 g Kalsiyum glukonat, 2 g Kalsiyum glukohexonat, 2 g Kalsiyum hipofosfit, 0,5 g Kalsiyum D-sakkarat, 3 g Magnezyum klorür içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Hipokalsemik felç olaylarında, başta sığırlar olmak üzere bütün evcil hayvanlarda kalsiyum eksikliklerine karşı koruyucu olarak, doğum humması, laktasyon tetanisi, çayır ve hipomagnezemik tetani, seyahat ve çayır tetanileri olarak tanınan hastalıklarda, raşitizm ve osteomalasi, genç hayvanlarda görülen büyümenin yavaşlaması veya durması, üreme performansının azalması; alerjiler, zehirlenmeler, sinirsel kökenli bozukluklar (morbus maculozus, serum hastalığı, eklemişiler, anafilaksiler, eksantermeler, hemorajik diyetezler, hematuri olayları ve alerjik olayların yatıştırılmasında.); kloroform, karbontetraklorür, organik fosforlu insektisitler başta olmak üzere civa, kurşun, bakır, kalay, kadmiyum gibi metallerle meydana gelen zehirlenmeler, besinsel zehirlenmeler ve hayvan sokmalarında, yüksek miktarda fosfor ve fosfat alımını gerektiren durumlarda kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde,

Doz Tablosu

Sığır	(200-500 kg canlı ağırlık)	80-100 ml
At	(200-500 kg canlı ağırlık)	80-100 ml
Koyun, Keçi	(25-50 kg canlı ağırlık)	15-25 ml

Damar içi, adale içi ve deri altı yolla uygulanır. Kalsimin Perfüzyonluk Çözelti'nin damar içi uygulaması yavaş yapılmalı, deri altı ve adale içi uygulamalarında doz bölünerek 3-4 yere ayrı ayrı enjekte edilmelidir.

Notlar

Hayvan saęlıęının geleceęini şekillendiriyoruz

vilsan[®]
pharmaceuticals

Notlar

Hayvan saęlıęının geleceęini şekillendiriyoruz



Notlar

Hayvan saęlıęının geleceęini şekillendiriyoruz



Notlar

Hayvan saęlıęının geleceęini şekillendiriyoruz



Notlar

Hayvan saėlıėının geleceėini şekillendiriyoruz

vilsan[®]
pharmaceuticals

Notlar

Hayvan saęlıęının geleceęini şekillendiriyoruz

vilsan[®]
pharmaceuticals

Notlar

Hayvan saęlıęının geleceęini şekillendiriyoruz

vilsan[®]
pharmaceuticals



www.vilsan.com.tr